

# Valutazione del rischio individuale in parodontologia

Paziente

---

# Valutazione del rischio individuale in parodontologia

Paziente

---


Operatore

An empty rectangular box with a thin blue border, positioned below the 'Operatore' label. It is currently blank, suggesting it is a placeholder for a diagram or additional text related to the operator's role in the risk assessment process.

# Calcolo del livello di rischio del paziente

Nome e Cognome .....

Fattore indicatore di rischio	Punteggio				
Fumo	0 punti	1 punti	2 punti	3 punti	4 punti
Diabete	0 punti	2 punti	4 punti		
Numero di tasche $\geq$ 5 mm	0 punti	1 punti	2 punti	3 punti	4 punti
Infiammazione gengivale (Indice di sanguinamento al sondaggio)	0 punti	1 punti	2 punti	3 punti	4 punti
Rapporto perdita ossea/età	0 punti	2 punti	4 punti	6 punti	8 punti
<b>Punteggio totale</b>	..... punti				



Oggi (data ...../...../.....) il livello di rischio è: \_\_\_\_\_

rischio basso   
  rischio medio-basso   
  rischio medio   
  rischio medio-elevato   
  rischio elevato

Oggi (data ...../...../.....) il livello di rischio è: \_\_\_\_\_

rischio basso   
  rischio medio-basso   
  rischio medio   
  rischio medio-elevato   
  rischio elevato

strappare la parte sottostante e lasciarla al paziente

## Qual è il suo livello di rischio?

Paziente .....

Oggi (data ...../...../.....)

il suo livello di rischio è:

rischio basso   
  rischio medio-basso   
  rischio medio   
  rischio medio-elevato   
  rischio elevato

Dalla corretta attuazione delle procedure preventive e terapeutiche, indicate a lato, deriva una migliore probabilità di mantenere a lungo una dentizione sana, funzionale ed esteticamente accettabile.

### IL SUO PROSSIMO APPUNTAMENTO

data ..... ora .....

## Come può modificare il suo livello di rischio?

- deve migliorare la tecnica di spazzolamento:
  - Bass                       Roll                       Spazzolino elettrico
- deve utilizzare un collutorio antimicrobico:
 

.....
- deve utilizzare strumenti di detersione interdentale:
  - filo                       spazzolino interdentale                       superfloss
- deve ridurre/eliminare il consumo di sigarette
- deve migliorare il suo stato diabetico (consigliata la visita diabetologica)
- deve ridurre la profondità delle tasche:
  - mediante terapia non chirurgica     mediante terapia chirurgica
- deve sottoporsi a chirurgia ossea ricostruttiva
- deve sottoporsi a sedute di igiene orale professionale ogni ..... mesi



# Valutazione del rischio individuale in parodontologia



*a cura di*




***Prof. Dr. Leonardo Trombelli  
Dr. Roberto Farina***

# Il calcolo del livello di rischio individuale.

Nel calcolo del livello di rischio individuale sono stati inseriti solo quei fattori/indicatori con comprovata validazione scientifica e di facile e rapida valutazione da parte dell'Odontoiatra.

Pur limitando la completezza del metodo, questo approccio ha consentito di formulare uno strumento di valutazione del rischio efficace e di semplice applicazione clinica.

1. **Utilizzare lo schema sottostante per assegnare il punteggio relativo ad ogni singolo fattore/indicatore di rischio:** all'interno degli schemi relativi a ciascun fattore/indicatore di rischio, barrare la casella corrispondente al rischio specifico del paziente. Si ricaverà così il punteggio relativo al rischio per quel fattore/indicatore.



**Rapporto perdita ossea/età**

Numero di denti che presentano perdita di osso  $\geq 4$  mm

		0	1-3	4-6	7-10	>10
età (anni)	0-25	0 punti	8 punti	8 punti	8 punti	8 punti
	26-40	0 punti	6 punti	6 punti	8 punti	8 punti
	41-50	0 punti	4 punti	4 punti	6 punti	8 punti
	51-65	0 punti	2 punti	4 punti	6 punti	8 punti
	>65	0 punti	0 punti	2 punti	4 punti	6 punti

2. **Sommare i punteggi all'interno della tabella riassuntiva:** riportare la somma dei 5 punteggi ottenuti, nella tabella a lato. Sommando i singoli punteggi si otterrà il "punteggio totale" che definisce il livello di rischio complessivo del paziente.

3. **Consigliare la terapia più adeguata al paziente (tabella a fianco).** I soggetti ad alto livello di rischio dovranno seguire programmi preventivi o terapeutici specifici affinché il livello di rischio diminuisca. I soggetti a basso livello di rischio dovranno perseverare nelle misure preventive e terapeutiche che aiutano a mantenere costantemente basso il livello di rischio.

