

Droga	In vitro	In vivo	In vivo (uomo)	Studi clinici	Note
Cammomilla	- -	- -	- -	- -	-Può aumentare l'effetto di ansiolitici. -Può potenziare l'effetto di anticoagulanti. -Aumento concentrazione dei Ca antagonisti -Può aumentare perdita di K -Può aumentare livelli serici di lovastatina, simvastatina (inibizione del CYP3A4)
Escolzia	-	-	-	-	Può interferire con farmaci sedativi ed antidepressivi IMAO
Iperico	+ +	+ -	+ +	+ +	- Aumento di azione serotoninergica con farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina (es. fluoxetina, paroxetina). Può ridurre effetti plasmatici di antiepilettici (es. fenobarbitale). - Può ridurre la concentrazione di metadone. Riduce livelli ematici degli inibitori delle proteasi e degli inibitori della trascrittasi HIV con possibile perdita dell'effetto soppressivo -Riduce la concentrazione di ciclosporina per induzione del CYP3A4 e della GL-P -può ridurre la biodisponibilità di digossina. -Può interferire con terapia contraccettiva -Può ridurre livelli ematici di teofillina (induzione del CYP3A4)
Luppolo	-	-	-	-	Può potenziare effetti di farmaci antidepressivi (triciclici di nuova generazione), sedativi (es. alprazolam), anticonvulsivanti (es. fenitoina, fenobarbital)
Melissa	+	-	-	-	Può aumentare l'effetto di benzodiazepine e pentobarbitale
Passiflora	-	-	-	-	Può aumentare l'effetto delle benzodiazepine
Valeriana	+	+	-	+	Con barbiturici può aumentare l'effetto della sedazione