

Corso

1- GMPF – Introduzione corso Geoarcheologia, morfologia e processi formativi

- **Prof. Stefano Lugli**

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Via Campi 103
41125 Modena
Italy

Tel. +39-059-2058475

E-mail: stefano.lugli@unimore.it

<http://www.dscg.unimore.it/site/home.html>

<https://www.facebook.com/Geologia-Unimore-172757972775575/?fref=ts>

Struttura del corso

- Quaternario
- Stratigrafia e sedimentologia
- Geoarcheologia degli ambienti alluvionali
- Geoarcheologia di Pompei e Ercolano
- ESERCITAZIONE: UNA esercitazione di UN giorno. La discussione della colonna stratigrafica compilata durante l'esercitazione è parte integrante dell'esame. Gli studenti impossibilitati a partecipare all'esercitazione dovranno portare all'esame un esempio di sequenza stratigrafica di interesse archeologico a scelta (pubblicata o inedita) concordata con il docente via email.

1. Il Quaternario

-Terziario... Quaternario!
- Era glaciale!




Il Quaternario

- Era glaciale (periodi glaciali e interglaciali)
- Ultimi 800 ka 10 cicli completi rapidi ed ampi (nel Quaternario circa 50 oscillazioni)
- Avanzamento/ritiro dei ghiacci, alternanza di fasi aride e umide
- Complessità di forme morfologiche, di sedimenti, di associazioni biologiche, tra cui quelle antropiche

Ricostruzioni ambientali

- Caratteristiche stratigrafiche → quadro geologico
- Analisi degli indicatori (proxy record) nelle successioni stratigrafiche → ricostruzioni paleoambientali
- Successione degli eventi → quadro cronostratigrafico
- Relazioni tra stratigrafie → correlazioni
- Approccio integrato regionale → sintesi paleoambientale


Problemi



- Documentazione in ambiente continentale è molto frammentaria (scarsità affioramenti, lacune)
- Ciclicità dei cambiamenti climatici ha prodotto simili condizioni e ambienti in tempi diversi 
correlazioni incerte (spesso non possibili datazioni dirette)
- Si procede con studi interdisciplinari: stratigrafia, sedimentologia, botanica, zoologia archeologia, geochimica, ecc.

Era glaciale

- 5 glaciazioni Donau, Gunz, Mindel, Riss, Wurm
- Teoria glacio-eustatica: variazioni del livello del mare
- Fasi espansione glaciale estensione della tundra a latitudini più basse: zone periglaciali

Studi dei sedimenti quaternari




- Analisi sedimentologica e stratigrafica sequenziale
- Perforazioni, indagini paleomagnetiche e sismiche
- Analisi paleontologiche e paleovegetazionali (pollini, dendrocronologia)
- Datazioni assolute (carbonio, amino-stratigrafia, risonanza elettronica, luminescenza, radioisotopi)
- Isotopi ossigeno su microfossili marini (stratigrafia completa, temperatura dell'acqua)
- Perforazioni dei ghiacci polari: condizioni atmosferiche e climatiche del passato (isotopi O  stadi isotopici, gas atmosferici, composti chimici, polvere)



$$\delta^{18}\text{O} = \frac{^{18}\text{O}}{^{16}\text{O}}$$


OXYGEN ISOTOPE CHRONOLOGY

"MIS" Marine oxygen Isotope Stages



Struttura del Quaternario

- Periodi **glaciali**: fasi fredde di lunga durata con espansione glaciale
- Episodi **stadiali**: episodi freddi di minor durata con espansione glaciale di minor durata
- Periodi **interglaciali**: fasi di lunga durata con temperature medie simili o maggiori a quelle attuali (e Olocene)
- Episodi **interstadiali**: episodi temperati di relativo riscaldamento in una fase di generale raffreddamento con temperature che non raggiunsero quelle attuali





2008 INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART



International Commission on Stratigraphy

Phanerozoic	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP	
Cenozoic	Quaternary *	Holocene			0.0117	↗	
			Upper		0.126		
		Pleistocene	"Ionian"		0.781		
			Calabrian		1.806	↗	
			Gelasian		2.588	↗	
			Pliocene		3.600	↗	
		Neogene	Pliocene	Piacenzian		3.600	↗
				Zanclean		5.332	↗
			Miocene	Messinian		7.246	↗
				Tortonian		11.608	↗
	Serravallian				13.82	↗	
	Langhian				15.97	↗	
	Burdigalian				20.43	↗	
	Aquitanian				23.03	↗	
	Oligocene			Chattian		28.4 ± 0.1	↗
				Rupelian		33.9 ± 0.1	↗
	Eocene			Priabonian		37.2 ± 0.1	↗
		Bartonian		40.4 ± 0.2	↗		
		Lutetian		48.6 ± 0.2	↗		
		Ypresian		55.8 ± 0.2	↗		
		Thanetian		58.7 ± 0.2	↗		
Paleocene	Selandian		~ 61.1	↗			
	Danian		65.5 ± 0.3	↗			
	Cretaceous	Upper	Maastrichtian		70.6 ± 0.6	↗	
Campanian				83.5 ± 0.7	↗		
Santonian				85.8 ± 0.7	↗		
Coniacian				~ 88.6	↗		
Turonian				93.6 ± 0.8	↗		
Lower		Cenomanian		99.6 ± 0.9	↗		
		Albian		112.0 ± 1.0	↗		
		Aptian		125.0 ± 1.0	↗		
		Barremian		130.0 ± 1.5	↗		
		Hauterivian		~ 133.9	↗		
Valanginian		140.2 ± 3.0	↗				
Berriasian		145.5 ± 4.0	↗				

Phanerozoic	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Mesozoic	Jurassic	Upper	Tithonian		145.5 ± 4.0	↗
			Kimmeridgian		150.8 ± 4.0	↗
			Oxfordian		~ 155.6	↗
		Middle	Callovian		161.2 ± 4.0	↗
			Bathonian		164.7 ± 4.0	↗
			Bajocian		167.7 ± 3.5	↗
			Aalenian		171.6 ± 3.0	↗
		Lower	Toarcian		175.6 ± 2.0	↗
			Pliensbachian		183.0 ± 1.5	↗
			Sinemurian		189.6 ± 1.5	↗
	Hettangian			196.5 ± 1.0	↗	
	Rhaetian			199.6 ± 0.6	↗	
	Norian			203.6 ± 1.5	↗	
	Carnian			216.5 ± 2.0	↗	
	Triassic	Upper	Ladinian		~ 228.7	↗
			Anisian		237.0 ± 2.0	↗
		Lower	Olenekian		~ 245.9	↗
	Paleozoic	Permian	Induan		~ 249.5	↗
			Changhsingian		251.0 ± 0.4	↗
			Wuchiapingian		253.8 ± 0.7	↗
		Lopingian	Capitanian		260.4 ± 0.7	↗
Wordian				265.8 ± 0.7	↗	
Guadalupian		Roadian		268.0 ± 0.7	↗	
		Kungurian		270.6 ± 0.7	↗	
Cisuralian		Artinskian		275.6 ± 0.7	↗	
		Sakmarian		284.4 ± 0.7	↗	
		Asselian		284.4 ± 0.7	↗	
		Gzhelian		294.6 ± 0.8	↗	
	Kasimovian		299.0 ± 0.8	↗		
Carboniferous	Pennsylvanian	Upper		303.4 ± 0.9	↗	
		Middle		307.2 ± 1.0	↗	
		Lower		311.7 ± 1.1	↗	
	Mississippian	Upper		318.1 ± 1.3	↗	
		Middle		318.1 ± 1.3	↗	
		Lower		328.3 ± 1.6	↗	
Tournaisian		359.2 ± 2.5	↗			

Phanerozoic	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Paleozoic	Devonian	Upper	Famennian		359.2 ± 2.5	↗
			Frasnian		374.5 ± 2.6	↗
			Givetian		385.3 ± 2.6	↗
		Middle	Eifelian		391.8 ± 2.7	↗
			Emsian		397.5 ± 2.7	↗
			Pragian		407.0 ± 2.8	↗
		Lower	Lochkovian		411.2 ± 2.8	↗
			Pridoli		416.0 ± 2.8	↗
			Ludlow		418.7 ± 2.7	↗
			Ludfordian		421.3 ± 2.6	↗
	Silurian	Wenlock	Gorstian		422.9 ± 2.5	↗
			Homerian		426.2 ± 2.4	↗
		Llandovery	Sheinwoodian		428.2 ± 2.3	↗
			Telychian		436.0 ± 1.9	↗
			Aeronian		439.0 ± 1.8	↗
	Ordovician	Upper	Rhuddanian		443.7 ± 1.5	↗
			Himantian		445.6 ± 1.5	↗
		Middle	Katian		445.8 ± 1.6	↗
			Sandbian		455.8 ± 1.6	↗
		Lower	Darriwilian		460.9 ± 1.6	↗
			Dapingian		468.1 ± 1.6	↗
Floian				471.8 ± 1.6	↗	
Tremadocian				478.6 ± 1.7	↗	
Furongian				488.3 ± 1.7	↗	
Cambrian			Stage 10		~ 492 *	↗
			Stage 9		~ 496 *	↗
	Paibian		~ 499	↗		
Series 3	Guzhangian		~ 503	↗		
	Drumian		~ 506.5	↗		
	Stage 5		~ 510 *	↗		
	Stage 4		~ 515 *	↗		
	Stage 3		~ 521 *	↗		
Terreneuvian	Stage 2		~ 528 *	↗		
	Fortunian		542.0 ± 1.0	↗		

Phanerozoic	Erathem Era	System Period	Age Ma	GSSP
Proterozoic	Neo-proterozoic	Ediacaran	542	↗
		Cryogenian	~ 635	↗
		Tonian	850	↗
	Meso-proterozoic	Stenian	1000	↗
		Ectasian	1200	↗
		Calymnian	1400	↗
		Statherian	1600	↗
	Paleo-proterozoic	Orosirian	1800	↗
		Rhyacian	2050	↗
		Siderian	2300	↗
		Neoproterozoic	2500	↗
Archean	Neoarchean	2800	↗	
	Mesoarchean	3200	↗	
	Paleoarchean	3600	↗	
	Eoarchean	4000	↗	
Hadean (informal)			~ 4600	↗

Subdivisions of the global geologic record are formally defined by their lower boundary. Each unit of the Phanerozoic (~542 Ma to Present) and the base of Ediacaran are defined by a basal Global Standard Section and Point (GSSP ↗), whereas Precambrian units are formally subdivided by absolute age (Global Standard Stratigraphic Age, GSSA). Details of each GSSP are posted on the ICS website (www.stratigraphy.org).

Numerical ages of the unit boundaries in the Phanerozoic are subject to revision. Some stages within the Cambrian will be formally named upon international agreement on their GSSP limits. Most sub-Series boundaries (e.g., Middle and Upper Aptian) are not formally defined.

Colors are according to the Commission for the Geological Map of the World (www.cgmw.org).

The listed numerical ages are from 'A Geologic Time Scale 2004', by F.M. Gradstein, J.G. Ogg, A.G. Smith, et al. (2004; Cambridge University Press) and 'The Concise Geologic Time Scale' by J.G. Ogg, G. Ogg and F.M. Gradstein (2008).

This chart was drafted by Gabi Ogg. Intra Cambrian unit ages with * are informal, and awaiting ratified definitions.

Copyright © 2008 International Commission on Stratigraphy

* Definition of the Quaternary and revision of the Pleistocene are under discussion. Base of the Pleistocene is at 1.81 Ma (base of Calabrian), but may be extended to 2.59 Ma (base of Gelasian). The historic "Tertiary" comprises the Paleogene and Neogene, and has no official rank.

2008



INTE

2009





INTE

Eonothem Eon	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	
C	Cenozoic	Quaternary *	Holocene		0.0117	
			Pleistocene	Upper	0.126	
				"Ionian"	0.781	
				Calabrian	1.806	
				Gelasian	2.588	
			Pliocene	Piacenzian	3.600	
				Zanclean	5.332	
			Neogene	Miocene	Messinian	7.246
					Tortonian	11.608
		Serravallian			13.82	
		Langhian			15.97	
		Burdigalian			20.43	
		Aquitanian			23.03	

Eonothem Eon	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	
C	Cenozoic	Quaternary	Holocene		0.0117	
			Pleistocene	Upper	0.126	
				"Ionian"	0.781	
				Calabrian	1.806	
				Gelasian	2.588	
			Pliocene	Piacenzian	3.600	
				Zanclean	5.332	
			Neogene	Miocene	Messinian	7.246
					Tortonian	11.608
		Serravallian			13.82	
		Langhian			15.97	
		Burdigalian			20.43	
		Aquitanian			23.03	

Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years v. 2011







Scientists take sediment cores from the bottom of the ocean all over the world, and then measure the ratio of Oxygen 16 to Oxygen 18 in the calcite shells of the foraminifera.

Oxygen 16 is preferentially evaporated from the oceans, some of which falls as snow on continents. Times when snow and glacial ice buildup occur therefore see a corresponding enrichment of the oceans in Oxygen 18. Thus the O18/O16 ration changes over time, mostly as a function of the volume of glacial ice on the planet.

Shackleton (1969) recognized that in an informal sense, the marine oxygen isotope record is useful in relation to Quaternary stratigraphy in general, rather than purely to the marine record.




Diachronic limit
 Poorly dated limit
 Partially coeval events



Lugli S.e Marchetti Dori S., 2011. Evoluzione sedimentaria dell'area tra Formigine e Baggiovara alla luce dei nuovi scavi archeologici. In: "L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO), le indagini archeologiche e archeometriche". Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna, 27, 117-124.

Lugli S., Marchetti Dori S. & Fontana D., 2007. Alluvial sand composition as a tool to unravel the Late Quaternary sedimentation of the Modena Plain, northern Italy. Geological Society of America Special Paper 420, 57-72





*Fiume Secchia
Sorbara, 2004*



Aprile 2004

Ottobre 2005



*Fiume Secchia
Campogalliano*


Scavo ferrovia Bologna-Verona Crevalcore




Scavo Via Cesana
Modena



F. Panaro Spilamberto (MO)



Lugli S., Marchetti
Dori S. & Fontana
D., 2007.



Legenda


-  Torba
-  Argilla organica
-  Argilla
-  Limo
-  Sabbia
-  Ghiaia
-  Laminazione
-  Materiale lapideo
-  Laterizio
-  Conglomerato cementizio
-  Malta
-  Frammenti di laterizi
-  Frammenti di malte

Argentino C., Lugli S., Marchetti Dori S., 2015, Evoluzione sedimentaria del centro storico di Modena nel tardo Quaternario. Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, 146, 49-62.



Legenda

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| Argilla | Tracce di carbone |
| | |
| Limo | Frammenti di laterizi |
| | |
| Sabbia | Gasteropodi |
| | |
| Ghiaia | Calcinelli |
| | |
| Materiale lapideo | Resti vegetali |
| | |
| Laterizio | Frammenti di malte |
| | |
| Conglomerato cementizio | Screziature |
| | |
| Malta | Ciottoli |
| | |
| Torba | Laminazione |
| | |
| Argilla organica | Radici |
| | |



C4

Argilla
 Colore 2.5y 3.1 very dark grey
 Argilla torbosa grigio scura da 11,81 m a 11,93 m
 Laminazione Argilla/Limo da 11,93 m a 12,25 m

Argilla limosa
 Colore 2.5y 4.1 dark reddish grey; sono presenti resti vegetali e frequenti tracce di carbone millimetriche. Si trovano lamine di argilla più scura ricca in sostanza organica fino a 13,25 m

Argilla limosa con lamine organiche
 Colore 2.5y 4.1 dark reddish grey; tracce di carbone millimetriche
 Torba con resti di gasteropodi da 13,66 m a 13,69 m
 Argilla torbosa nera con frammenti di gasteropodi da 13,69 m a 13,81m
 Argilla nera omogenea, priva di resti organici macroscopici da 13,81m a 14 m
 Argilla limosa screziata (screziature distanziate tra loro di 10 cm circa) da 14 m a 15 m
 Colore 2.5y 3.1 very dark grey
 Lamine di argilla più scura con presenza di calcinelli millimetrici da 14,60 m a 14,68 m
 Argilla screziata con tracce poco diffuse di carbone (concentrate tra 15 m e 15,25 m)
 Livello d'argilla organica tra 15,04 m e 15,06 m; presenza di radici

C7

Argilla limosa. Colore 2.5 y 4.1 dark reddish grey
 Screziature marroni-rossicce presenti da 16,10 m a 16,70m
 Alla base sono presenti resti vegetali legnosi (di lunghezza inferiore a 3 cm)

Argilla limosa. Colore 2.5y 4.1 dark reddish grey
 Lamine di argilla organica da 17,70 m fino 17,85 m; calcinelli concentrati a 17,90 m

C8

Torba
 Argilla limosa grigia, più chiara alla base (2.5y 4.2 dark greysh brown - 2.5y 3.1 very dark grey)

Limo argilloso con sottili lamine di sabbia fine-finissima. Presenza di leggere screziature rossastre. Colore 2.5y 5.1 grey


Sabbia medio-fine argillosa. Colore 2.5y 5.1 grey

Ghiaia
 Clasti di diametro variabile (0,5- 5 cm)

Variazione di colore della matrice: sfumature marrone chiaro alla base tendenti al grigio verso il tetto (2.5y 4.4 olive brown - 2.5y 5.1 grey)



facies deposizionali



DEPOSITI ANTROPICI



❖ Depositi antropici

VENTAGLIO DI ROTTA



❖ Facies di ventaglio di rotta

DEPOSITI ANTROPICI



❖ Depositi antropici

ARGINE NATURALE



❖ Facies di argine

PIANA INONDABILE



❖ Facies di piana inondabile

PIANA INONDABILE



PALUDE



ARGINE NATURALE



PIANA INONDABILE



PALUDE



PIANA INONDABILE



PALUDE



❖ Facies di palude

PIANA INONDABILE



PIANA INONDABILE



PALUDE



PIANA INONDABILE





CANALE



❖ Facies di canale

Ricostruzione del profilo di sottosuolo



Argentino C., Lugli S., Marchetti Dori S., 2015

Sezione stratigrafica Centro Storico

NE


SO

PZ1 (2010)







PZ2 (2010)

SG (2012)

S1(PG) (2008)



10 m

- | | | |
|--|--|---|
|  Depositi antropici |  Canale |  Argine naturale |
|  Rotte fluviali |  Piana inondabile |  Palude |