Elettrochimica

Simone Meloni

University
of Ferrara

Department
of Chemical and
Pharmaceutical Sciences

Test di autovalutazione

Home

Organizzazione

Attività didattiche

Garanzia di Qualità

FAQ

Dove siamo e contatti

Chimica Generale ed Inorganica

▼ Materiale didattico

Lezione 1 - cap 1-2 materia e struttura atomica - Berardi

Lezione 2 - cap 7 modello quantomeccanico - Berardi

Lezione 3 - cap 8 periodicità - Berardi

Esercizi - mole

Lezione 4 - cap 3 e par 9.4 molecole, composti ionici e nomenclatura - Berardi

Lezione 5 - cap 9 legame covalente - Berardi

Lezione 6 - cap 10 geometria molecolare, VSEPR - Berardi

Lezione 7 - cap 4 reazioni e stechiometria - Berardi

video_01_molarità e diluizione

video_02_precipitazione Pbl2 e resa percentuale

video_03_precipitazione BaSO4 e conservazione massa

video_04_reazione con sviluppo di gas

video_05_sale in ambienti diversi

Lezione 8 - par 4.9 e par 19.2 redox - Berardi

soluzioni autovalutazione biotecmed00

Lezione 9 - cap 5 gas - Berardi

esercizi aggiuntivi_Berardi

Lezione 10 - cap 6 termochimica -

Materiale didattico

Lezione 1 - cap 1-2 materia e struttura atomica - Berardi

Lezione 2 - cap 7 modello quantomeccanico - Berardi

Lezione 3 - cap 8 periodicità - Berardi

Esercizi - mole

Lezione 4 - cap 3 e par 9.4 molecole, composti ionici e nomenclatura - Berardi

Lezione 5 - cap 9 legame covalente - Berardi

Lezione 6 - cap 10 geometria molecolare, VSEPR - Berardi

Lezione 7 - cap 4 reazioni e stechiometria - Berardi

video_01_molarità e diluizione

video_02_precipitazione Pbl2 e resa percentuale

video_03_precipitazione BaSO4 e conservazione massa

video_04_reazione con sviluppo di gas

video_05_sale in ambienti diversi

Lezione 8 - par 4.9 e par 19.2 redox - Berardi

soluzioni autovalutazione biotecmed00

Lezione 9 - cap 5 gas - Berardi

esercizi aggiuntivi_Berardi

Lezione 10 - cap 6 termochimica - Meloni

soluzioni autovalutazione biotecmed01

Lezione 11.1 - cap 15 equilibrio chimico - Meloni

- Verificare la soluzione del secondo test di autovalutazione sul mini-sito del corso

Richiamo: bilanciamento reazioni RedOx

<p>1. Assegnare gli stati di ossidazione a tutti gli atomi e identificare le sostanze ossidate e ridotte.</p>
<p>2. Separare la reazione nelle due semireazioni: una di ossidazione e l'altra di riduzione.</p>	<p>Ossidazione: $\text{Al}(s) \longrightarrow \text{Al}^{3+}(aq)$</p> <p>Riduzione: $\text{Cu}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Cu}(s)$</p>	<p>Ossidazione: $\text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Fe}^{3+}(aq)$</p> <p>Riduzione: $\text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq)$</p>
<p>3. Bilanciare ciascuna semireazione rispetto alla massa nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> bilanciare tutti gli elementi diversi da H e O; bilanciare O aggiungendo H_2O; bilanciare H aggiungendo ioni H^+. 	<p>Tutti gli elementi sono bilanciati, procedere quindi al passaggio successivo.</p>	<p>Tutti gli elementi diversi da H e O sono bilanciati, procedere a bilanciare H e O.</p> <p>$\text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Fe}^{3+}(aq)$</p> <p>$\text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 4 \text{H}_2\text{O}(l)$</p> <p>$8 \text{H}^+(aq) + \text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 4 \text{H}_2\text{O}(l)$</p>

Richiamo: bilanciamento reazioni RedOx

<p>4. <i>Bilanciare ciascuna semireazione rispetto alla carica aggiungendo elettroni (eguagliare la somma delle cariche su entrambi i lati aggiungendo gli elettroni necessari).</i></p>	$\text{Al}(s) \longrightarrow \text{Al}^{3+}(aq) + 3 e^{-}$ $2 e^{-} + \text{Cu}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Cu}(s)$	$\text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Fe}^{3+}(aq) + 1 e^{-}$ $5 e^{-} + 8 \text{H}^{+}(aq) + \text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 4 \text{H}_2\text{O}(l)$
<p>5. <i>Rendere uguale il numero di elettroni in entrambe le semireazioni moltiplicando una o entrambe le semireazioni per un numero piccolo intero.</i></p>	$2[\text{Al}(s) \longrightarrow \text{Al}^{3+}(aq) + 3 e^{-}]$ $2 \text{Al}(s) \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+}(aq) + 6 e^{-}$ $3[2 e^{-} + \text{Cu}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Cu}(s)]$ $6 e^{-} + 3 \text{Cu}^{2+}(aq) \longrightarrow 3 \text{Cu}(s)$	$5[\text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Fe}^{3+}(aq) + 1 e^{-}]$ $5 \text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow 5 \text{Fe}^{3+}(aq) + 5 e^{-}$ $5 e^{-} + 8 \text{H}^{+}(aq) + \text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 4 \text{H}_2\text{O}(l)$
<p>6. <i>Sommare le due semireazioni, eliminando gli elettroni e altre specie, se necessario.</i></p>	$2 \text{Al}(s) \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+}(aq) + 6 e^{-}$ $6 e^{-} + 3 \text{Cu}^{2+}(aq) \longrightarrow 3 \text{Cu}(s)$ <hr/> $2 \text{Al}(s) + 3 \text{Cu}^{2+}(aq) \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+}(aq) + 3 \text{Cu}(s)$	$5 \text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow 5 \text{Fe}^{3+}(aq) + 5 e^{-}$ $5 e^{-} + 8 \text{H}^{+}(aq) + \text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 4 \text{H}_2\text{O}(l)$ <hr/> $5 \text{Fe}^{2+}(aq) + 8 \text{H}^{+}(aq) + \text{MnO}_4^{-}(aq) \longrightarrow 5 \text{Fe}^{3+}(aq) + \text{Mn}^{2+}(aq) + 4 \text{H}_2\text{O}(l)$

Esempio di reazione RedOx

+

=

Cella voltaica: semi-reazioni RedOx spazialmente separate

Cella voltaica: equilibrio chimico at work

- Prima di «unire» le due soluzioni
 1. Le due semi-reazioni raggiungono l'equilibrio
 2. Gli ioni Zn^{2+} e Cu^{2+} eventualmente prodotti vengono solubilizzati
 3. Gli elettroni *liberi* prodotti dalle semi-reazioni si accumulano sugli elettrodi
 4. La semi-reazione dello zinco è più spostata verso DX di quella del rame

Cella voltaica: equilibrio chimico at work

- I due elettrodi vengono uniti da fili e da un utilizzatore...

1. Gli elettroni dell'elettrodo di zinco, avendo una densità maggiore, sono a potenziale più alto di quelli sull'elettrodo di rame: questo risulta in un flusso elettronico
2. Un prodotto viene sottratto alla semi-reazione dello zinco: per Le Châtelier la semi-reazione si sposta più a DX, consumando ulteriore Zn^0 dell'elettrodo
3. Un prodotto viene aggiunto alla semi-reazione del rame: per Le Châtelier la semi-reazione si sposta più a SX, riducendo Cu^{2+} della soluzione con l'eccesso di elettroni proveniente dall'elettrodo di Zn.

Cella voltaica: equilibrio chimico at work

- ...e le due soluzioni da un ***ponte salino***
 1. L'eccesso di Zn^{2+} da un lato e il deficit di Cu^{2+} dall'altro rendono le due soluzioni cariche
 - Potenziale attrattivo per gli elettroni dell'elettrodo Zn e repulsivo per quello Cu
 2. L'elettroneutralità viene garantita dagli ioni del ponte salino, che vengono solubilizzati nella cella dello zinco e del rame
 - Solubilità degli ioni del ponte > degli elettroni

Cella voltaica: questioni nominalistiche

- La pila si rappresenta simbolicamente considerando sia la reazione RedOx sottesa che gli elementi costruttivi che la caratterizzano:
diagramma di cella

- SX semi-reazione di ossidazione, DX quella di riduzione
- Per ogni cella, si indica con una barretta verticale la separazione tra sue fasi fisiche, Zn solido $\mid$ Zn^{2+} in soluzione
- Il ponte salino si denota con la doppia barra, $\parallel$

Cella voltaica: questioni nominalistiche

- Una virgola separa le specie che si trovano nella stessa fase
- '|Pt' elettrodo inerte in platino...che trasporta il *reagente* 'e' per svolgere la reazione

La termodinamica della cella voltaica: il potenziale di cella

- Differenza di potenziale elettrico tra i due elettrodi

$$\Delta E = -\Delta G/nF$$

Pari all'energia libera ΔG , max quantità di lavoro chimico che la cella può compiere, diviso la quantità di carica per unità di reazione, nF

- Definizione consistente con quella del potenziale elettrostatico:

potenziale elettrostatico = energia / carica di prova

- F = costante di Faraday, quantità di carica in coulomb per mole di elettroni
 - n quantità di elettroni scambiati nella reazione
 - Se ΔG è espresso in joule, nF è in coulomb, ΔE è in volt
-
- Per convenzione – vedere lez. Termochimica – il lavoro è negativo quando esercitato dal sistema sull'ambiente. Quindi, $\Delta G < 0$ è il processo che spontaneamente si compie associato al lavoro chimico fatto dal sistema sull'ambiente
 - **$\Delta G < 0$ reazione spontanea**

Cella voltaica: potenziale di cella

- ΔG , la massima quantità di lavoro chimico che si possa svolgere in una reazione, dipende dalla concentrazione di reagenti e prodotti, $[\text{Zn}^{2+}]$ e $[\text{Cu}^{2+}]$ nel nostro esempio
 - Perché soli $[\text{Zn}^{2+}]$ e $[\text{Cu}^{2+}]$?
- Possiamo allora definire il massimo lavoro che possa compiere un sistema in condizioni di riferimento, e.g. 1M se è in soluzione o 1atm se è gassoso $\rightarrow \Delta G^0$
- Possiamo così introdurre la differenza di potenziale standard: $\Delta E^0 = -\Delta G^0/nF$

Potenziale standard di elettrodo

- Data una reazione e l'associata variazione di energia libera si può stabilire se questa avvenga.
- E' possibile fare una tale previsione per una RedOx che consiste di due semi-reazioni qualsivoglia senza aver esplicitamente misurato il corrispondente ΔG o ΔE ?
- La doppia cella in cui la coppia A/A^+ riduce H^+ a H_2 e B^+/B ossida H_2 a H^+ produce come effetto globale lo stesso della reazione $A^+ + B \rightarrow A + B^+$

Il ΔG dell'intero processo e' la somma del ΔG di $A + H^+ \rightarrow A^+ + \frac{1}{2} H_2$ e $B^+ + \frac{1}{2} H_2 \rightarrow B + H^+$ (l'energia libera e' una funzione di stato)

- Possiamo allora
 1. definire come riferimento la semi-reazione di riduzione (ossidazione) $\frac{1}{2} H^+ + e \rightarrow H_2$
 2. Misurare il potenziale di cella di una pila formata da un elettrodo ad idrogeno e un elettrodo complementare
 3. Definire come potenziale dell'elettrodo (complementare) il potenziale di questa cella
 4. Il potenziale della cella formata da due elettrodi sar la somma algebrica dei potenziali dei due elettrodi calcolati rispetto all'idrogeno
- Il potenziale standard di elettrodo quello misurato in **condizioni standard**, 1M per le specie in soluzione, 1atm per le specie gassose

Potenziale standard di elettrodo

Più e' alto il potenziale più *fortemente* avverrà la reazione di riduzione (rispetto all'ossidazione dell'idrogeno)
 $\Delta G^0 = -nF \Delta E^0 \rightarrow \Delta E^0 > 0 \rightarrow \Delta G < 0$ (spontaneo)

$$\Delta E^0 = 2.87 - 1.78 = 1.09 \text{ V}$$

$$\Delta G^0 = -1.09 \times 2 \times F < 0$$

Semireazione di riduzione

Agenti ossidanti più forti

Semireazione di riduzione	E^0 (V)
$F_2(g) + 2 e^- \rightarrow 2 F^-(aq)$	2.87
$H_2O_2(aq) + 2 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow 2 H_2O(l)$	1.78
$PbO_2(s) + 4 H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2 e^- \rightarrow PbSO_4(s) + 2 H_2O(l)$	1.69
$MnO_4^-(aq) + 4 H^+(aq) + 3 e^- \rightarrow MnO_2(s) + 2 H_2O(l)$	1.68
$MnO_4^-(aq) + 8 H^+(aq) + 5 e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 4 H_2O(l)$	1.51
$Au^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Au(s)$	1.50
$PbO_2(s) + 4 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow Pb^{2+}(aq) + 2 H_2O(l)$	1.46
$Cl_2(g) + 2 e^- \rightarrow 2 Cl^-(aq)$	1.36
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14 H^+(aq) + 6 e^- \rightarrow 2 Cr^{3+}(aq) + 7 H_2O(l)$	1.33
$O_2(g) + 4 H^+(aq) + 4 e^- \rightarrow 2 H_2O(l)$	1.23
$MnO_2(s) + 4 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 2 H_2O(l)$	1.21
$IO_3^-(aq) + 6 H^+(aq) + 5 e^- \rightarrow \frac{1}{2} I_2(aq) + 3 H_2O(l)$	1.20
$Br_2(l) + 2 e^- \rightarrow 2 Br^-(aq)$	1.09
$VO_2^+(aq) + 2 H^+(aq) + e^- \rightarrow VO^{2+}(aq) + H_2O(l)$	1.00
$NO_3^-(aq) + 4 H^+(aq) + 3 e^- \rightarrow NO(g) + 2 H_2O(l)$	0.96
$ClO_2(g) + e^- \rightarrow ClO_2^-(aq)$	0.95
$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$	0.80
$Fe^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Fe^{2+}(aq)$	0.77
$O_2(g) + 2 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow H_2O_2(aq)$	0.70
$MnO_4^-(aq) + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}(aq)$	0.56
$I_2(s) + 2 e^- \rightarrow 2 I^-(aq)$	0.54
$Cu^+(aq) + e^- \rightarrow Cu(s)$	0.52
$O_2(g) + 2 H_2O(l) + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-(aq)$	0.40
$Cu^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Cu(s)$	0.34
$SO_4^{2-}(aq) + 4 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow H_2SO_3(aq) + H_2O(l)$	0.20
$Cu^{2+}(aq) + e^- \rightarrow Cu^+(aq)$	0.16
$Sn^{4+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Sn^{2+}(aq)$	0.15
$2 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow H_2(g)$	0
$Fe^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Fe(s)$	-0.036
$Pb^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Pb(s)$	-0.13
$Sn^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Sn(s)$	-0.14
$Ni^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Ni(s)$	-0.23
$Cd^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Cd(s)$	-0.40
$Fe^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Fe(s)$	-0.45
$Cr^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Cr^{2+}(aq)$	-0.50
$Cr^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Cr(s)$	-0.73
$Zn^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Zn(s)$	-0.76
$2 H_2O(l) + 2 e^- \rightarrow H_2(g) + 2 OH^-(aq)$	-0.83
$Mn^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Mn(s)$	-1.18
$Al^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Al(s)$	-1.66
$Mg^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Mg(s)$	-2.37
$Na^+(aq) + e^- \rightarrow Na(s)$	-2.71
$Ca^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Ca(s)$	-2.76
$Ba^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Ba(s)$	-2.90
$K^+(aq) + e^- \rightarrow K(s)$	-2.92
$Li^+(aq) + e^- \rightarrow Li(s)$	-3.04

Agenti riducenti più deboli

Agenti riducenti più forti

Potenziale standard di elettrodo

Più E° alto il potenziale più *fortemente* avverrà la reazione di riduzione (rispetto all'ossidazione dell'idrogeno)
 $\Delta G^{\circ} = -nF \Delta E^{\circ} \rightarrow \Delta E^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G^{\circ} < 0$ (spontaneo)

$$\Delta E^{\circ} = 2 \times 1.51 - 5 \times 1.36 = -3.78 \text{ V} \rightarrow$$

$$\Delta G^{\circ} = 3.78 \times 10 \times F > 0$$

Semireazione di riduzione

Agenti ossidanti più forti	Semireazione di riduzione	$E^{\circ}(\text{V})$
	$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{F}^-(\text{aq})$	2.87
	$\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.78
	$\text{PbO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.69
	$\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.68
	$\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 8\text{H}^+(\text{aq}) + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.51
	$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$	1.50
	$\text{PbO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.46
	$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-(\text{aq})$	1.36
	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14\text{H}^+(\text{aq}) + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.33
	$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.23
	$\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.21
	$\text{IO}_3^-(\text{aq}) + 6\text{H}^+(\text{aq}) + 5\text{e}^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{I}_2(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.20
	$\text{Br}_2(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Br}^-(\text{aq})$	1.09
	$\text{VO}_2^+(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{VO}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.00
	$\text{NO}_3^-(\text{aq}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0.96
	$\text{ClO}_2(\text{g}) + \text{e}^- \rightarrow \text{ClO}_2^-(\text{aq})$	0.95
	$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$	0.80
	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	0.77
	$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$	0.70
	$\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_4^{2-}(\text{aq})$	0.56
	$\text{I}_2(\text{s}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-(\text{aq})$	0.54
	$\text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.52
	$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-(\text{aq})$	0.40
	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.34
	$\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0.20
	$\text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^0(\text{aq})$	0.16
	$\text{Sn}^{4+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Sn}^{2+}(\text{aq})$	0.15
	$2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	0
	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{s})$	-0.036
	$\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb}(\text{s})$	-0.13
	$\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Sn}(\text{s})$	-0.14
	$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{s})$	-0.23
	$\text{Cd}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cd}(\text{s})$	-0.40
	$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{s})$	-0.45
	$\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Cr}^{2+}(\text{aq})$	-0.50
	$\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{s})$	-0.73
	$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0.76
	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$	-0.83
	$\text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}(\text{s})$	-1.18
	$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}(\text{s})$	-1.66
	$\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{s})$	-2.37
	$\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}(\text{s})$	-2.71
	$\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ca}(\text{s})$	-2.76
	$\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ba}(\text{s})$	-2.90
	$\text{K}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{K}(\text{s})$	-2.92
	$\text{Li}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}(\text{s})$	-3.04

Agenti ossidanti più deboli

Agenti riducenti più deboli

Agenti riducenti più forti

Potenziale elettrochimico at work

Potenziale elettrochimico at work

Semireazione di riduzione

Agenti ossidanti
più forti

Semireazione di riduzione	E° (V)
$F_2(g) + 2 e^- \rightarrow 2 F^-(aq)$	2.87
$H_2O_2(aq) + 2 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow 2 H_2O(l)$	1.78
$PbO_2(s) + 4 H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2 e^- \rightarrow PbSO_4(s) + 2 H_2O(l)$	1.69
$MnO_4^-(aq) + 4 H^+(aq) + 3 e^- \rightarrow MnO_2(s) + 2 H_2O(l)$	1.68
$MnO_4^-(aq) + 8 H^+(aq) + 5 e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 4 H_2O(l)$	1.51
$Au^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Au(s)$	1.50
$PbO_2(s) + 4 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow Pb^{2+}(aq) + 2 H_2O(l)$	1.46
$Cl_2(g) + 2 e^- \rightarrow 2 Cl^-(aq)$	1.36
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14 H^+(aq) + 6 e^- \rightarrow 2 Cr^{3+}(aq) + 7 H_2O(l)$	1.33
$O_2(g) + 4 H^+(aq) + 4 e^- \rightarrow 2 H_2O(l)$	1.23
$MnO_2(s) + 4 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 2 H_2O(l)$	1.21
$IO_3^-(aq) + 6 H^+(aq) + 5 e^- \rightarrow \frac{1}{2} I_2(aq) + 3 H_2O(l)$	1.20
$Br_2(l) + 2 e^- \rightarrow 2 Br^-(aq)$	1.09
$VO_2^+(aq) + 2 H^+(aq) + e^- \rightarrow VO^{2+}(aq) + H_2O(l)$	1.00
$NO_3^-(aq) + 4 H^+(aq) + 3 e^- \rightarrow NO(g) + 2 H_2O(l)$	0.96
$ClO_2(g) + e^- \rightarrow ClO_2^-(aq)$	0.95
$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$	0.80
$Fe^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Fe^{2+}(aq)$	0.77
$O_2(g) + 2 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow H_2O_2(aq)$	0.70
$MnO_4^-(aq) + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}(aq)$	0.56
$I_2(s) + 2 e^- \rightarrow 2 I^-(aq)$	0.54
$Cu^+(aq) + e^- \rightarrow Cu(s)$	0.52
$O_2(g) + 2 H_2O(l) + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-(aq)$	0.40
$Cu^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Cu(s)$	0.34
$SO_4^{2-}(aq) + 4 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow H_2SO_3(aq) + H_2O(l)$	0.20
$Cu^{2+}(aq) + e^- \rightarrow Cu^+(aq)$	0.16
$Sn^{4+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Sn^{2+}(aq)$	0.15
$2 H^+(aq) + 2 e^- \rightarrow H_2(g)$	0
$Fe^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Fe(s)$	-0.036
$Pb^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Pb(s)$	-0.13
$Sn^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Sn(s)$	-0.14
$Ni^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Ni(s)$	-0.23
$Cd^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Cd(s)$	-0.40
$Fe^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Fe(s)$	-0.45
$Cr^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Cr^{2+}(aq)$	-0.50
$Cr^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Cr(s)$	-0.73
$Zn^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Zn(s)$	-0.76
$2 H_2O(l) + 2 e^- \rightarrow H_2(g) + 2 OH^-(aq)$	-0.83
$Mn^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Mn(s)$	-1.18
$Al^{3+}(aq) + 3 e^- \rightarrow Al(s)$	-1.66
$Mg^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Mg(s)$	-2.37
$Na^+(aq) + e^- \rightarrow Na(s)$	-2.71
$Ca^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Ca(s)$	-2.76
$Ba^{2+}(aq) + 2 e^- \rightarrow Ba(s)$	-2.90
$K^+(aq) + e^- \rightarrow K(s)$	-2.92
$Li^+(aq) + e^- \rightarrow Li(s)$	-3.04

Agenti riducenti
più deboli

Agenti ossidanti
più deboli

Agenti
riducenti più forti

Effetto della concentrazione

- I potenziali standard permettono di determinare
 - La spontaneità della reazione – i.e. realizzabilità della pila – in condizioni di concentrazioni standard
 - Il potenziale di cella in condizioni standard
- Cosa accade quando la concentrazione sia diversa da quella standard (1M o 1atm)?

Equazione di Nernst

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \log Q_{semi}; \quad Q_{semi} = \frac{[A_{red}]}{[A_{ox}]}$$

Placcatura

Effetto della concentrazione

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \log Q_{semi};$$

$$\Delta E^0 = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 - E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = 1.10$$

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 - \frac{0.0592}{2} \log \frac{1}{2} = 0.34 + 0.01 = 0.35$$

$$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 - \frac{0.0592}{2} \log \frac{1}{0.01} = -0.76 - 0.06 = -0.82$$

$$\Delta E = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = 1.17$$

Elettrolisi

- Elettrolisi: si sfrutta il passaggio di corrente elettrica per provocare lo svolgimento di una reazione di ossidoriduzione nella direzione opposta a quella spontanea

$$\Delta E^0 = 0.4 \text{ V} \rightarrow \Delta G^0 = 2F \Delta E^0 < 0 \text{ spontanea}$$

$$\Delta E^0 = -0.4 \text{ V} \rightarrow \Delta G^0 > 0 \text{ non spontanea}$$

$\text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4 \text{e}^-$	$\rightarrow 4 \text{OH}^-(\text{aq})$	0.40
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.34
$\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$	$\rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0.20
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Cu}^+(\text{aq})$	0.16
$\text{Sn}^{4+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Sn}^{2+}(\text{aq})$	0.15
$2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$	$\rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	0

Cella voltaica

Cella elettrolitica

Elettrolisi in soluzione acquosa: difficoltà

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^-$	$\longrightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.33
$\text{O}_2(\text{g}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 4 \text{e}^-$	$\longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.23
$\text{MnO}_4^-(\text{s}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.21
$\text{IO}_3^-(\text{aq}) + 6 \text{H}^+(\text{aq}) + 5 \text{e}^-$	$\longrightarrow \frac{1}{2} \text{I}_2(\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.20
$\text{Br}_2(\text{l}) + 2 \text{e}^-$	$\longrightarrow 2 \text{Br}^-(\text{aq})$	1.09
$\text{VO}_2^+(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{VO}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.00
$\text{NO}_3^-(\text{aq}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{NO}(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0.96
$\text{ClO}_2(\text{g}) + \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{ClO}_2^-(\text{aq})$	0.95
$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{Ag}(\text{s})$	0.80
$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	0.77
$\text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$	0.70
$\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{MnO}_4^{2-}(\text{aq})$	0.56
$\text{I}_2(\text{s}) + 2 \text{e}^-$	$\longrightarrow 2 \text{I}^-(\text{aq})$	0.54
$\text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$	$\longrightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.52
$\text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4 \text{e}^-$	$\longrightarrow 4 \text{OH}^-(\text{aq})$	0.40

$$\begin{aligned}
 E_{\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2} &= 1.23 - \frac{0.0592}{4} \log[H^+]^4 \\
 &= 1.23 - \frac{0.0592}{4} \log(10^{-7})^4 \\
 &= 1.23 - 0.41 = 0.82\text{V}
 \end{aligned}$$

Elettrolisi in soluzione acquosa: difficoltà

$Zn^{2+}(aq) + 2 e^-$	$\rightarrow Zn(s)$	-0.76
$2 H_2O(l) + 2 e^-$	$\rightarrow H_2(g) + 2 OH^-(aq)$	-0.83
$Mn^{2+}(aq) + 2 e^-$	$\rightarrow Mn(s)$	-1.18
$Al^{3+}(aq) + 3 e^-$	$\rightarrow Al(s)$	-1.66
$Mg^{2+}(aq) + 2 e^-$	$\rightarrow Mg(s)$	-2.37
$Na^+(aq) + e^-$	$\rightarrow Na(s)$	-2.71
$Ca^{2+}(aq) + 2 e^-$	$\rightarrow Ca(s)$	-2.76

$$\begin{aligned}
 E_{H_2O/H_2} &= -0.83 - \frac{0.0592}{2} \log[OH^-]^2 \\
 &= -0.83 - \frac{0.0592}{2} \log(10^{-7})^2 \\
 &= -0.83 + 0.42 = -0.41V
 \end{aligned}$$

Prova di autovalutazione **NON** simulazione d'esame

- 15 domande
- 90 minuti totali
- **Prova ANONIMA!!!**

- Scaricare app gratuita Exam Manager
- Registrarsi
- Scegliere icona «esame», la seconda da sinistra in basso
- Inserire **codice: Biotecmed02**

NB: La app permette di accedere alla prova UNA SOLA VOLTA: **attenzione**, l'uscita dalla app prima del completamento dell'intera prova non ne permette la valutazione.

- **Disponibile dalle ore 13 del 16/10/2019 alle 12 del 21/10/2019**