CL Dietistica AA 2016-17

Corso a Scelta:

Fisiopatologia e Clinica della Malnutrizione

Modulo Gastroenterologia

ASPETTI GASTROENTEROLOGICI
COLLEGATI ALLA MALNUTRIZIONE

OBESITÀ: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Condizione clinica caratterizzata da un eccesso di peso corporeo secondario ad un accumulo di tessuto adiposo in misura tale da influire negativamente sullo stato di salute.

	BMI (kg/m ²)	CLASSE OBESITÀ
Sottopeso	< 18.5	
Normale	18.5-24.9	
Sovrappeso	25-29.9	
Obesità	30-34.9	Obesità di grado I obesità lieve
	35-39.9	Obesità di grado II obesità moderata
	≥40	Obesità di grado III obesità grave

OBESITÀ: EPIDEMIOLOGIA

Prevalenza dell'obesità (BMI > 30 Kg/m²) nel mondo (OMS 2002).

IR: Conseguenze Metaboliche

Aumento della produzione epatica di glucosio

Ridotta utilizzazione di glucosio

Ridotta inibizione della lipolisi

↑ FFA

Insulina

Iperinsulinemia compensatoria con progressivo esaurimento cellule β

LA MICROFLORA GASTRO-INTESTINALE

Stomaco e Duodeno ($10^2 - 10^3$ CFU/ml)

Lactobacilli

Helicobacter pylori

Digiuno e Ileo ($10^4 - 10^8$ CFU/ml)

Lactobacilli

Enterobacter

Bacteroides

Bifidobacter

Colon ($10^{10} - 10^{12}$ CFU/ml)

Bacteroides

Bifidobacter

Clostridium

Enterococchi

Ruminococcus

Stafilococchi

Proteus... + di 500 specie!

Funzioni della microflora intestinale

- Fermentazione di polisaccaridi di origine vegetale
- Assorbimento degli acidi grassi a catena corta
- Produzione gas intestinali
- Sintesi di folati, vitamina B e vitamina K
- Protezione da agenti patogeni (es. Clostridi)
- Sviluppo epiteliale intestinale (funzione trofica)
- Metabolismo degli acidi biliari
- Deconiugazione della bilirubina
- Conversione di profarmaci in metaboliti attivi

Composizione della microflora intestinale

Firmicutes (51%)

Bacteroides (48%)

*Producono butirrato
attraverso la
metabolizzazione dei
carboidrati complessi*

*Idrolizzano
polisaccaridi
altrimenti indigeribili
(fino al 15%
dell'introito calorico)*

Ekberg et al. 2005

Gli individui obesi hanno percentuali inferiori di *Bacteroides* e maggiori di *Firmicutes* se comparati con individui normopeso

Ley et al. 2006

Composizione della microflora intestinale

Methanobrevibacter Smithii (Archaea sp.)

Converte l'idrogeno prodotto dalla digestione degli amidi in metano

Migliore efficienza nella produzione di butirrato e nell'estrazione energetica

Microflora e allattamento

Neonato alla nascita: intestino sterile

Latte materno:
Bifidobatteri

ALLATTAMENTO

Latte artificiale:
Bacteroidi
Clostridi

Dopo lo svezzamento: diversificazione della microflora

Nell'adulto: complessa e abbondante microflora

Alterazioni della microflora

- ◆ Dieta
- ◆ Stile di vita moderno
- ◆ Farmaci (antibiotici)
- ◆ Patogeni infettivi
- ◆ Chirurgia intestinale

Possono alterare
transitoriamente
la composizione della flora

STUDIO DEL MICROBIOTA INTESTINALE

Test diretto

- Aspirazione diretta contenuto digiunale

Intubazione
duodeno-
digiunale

Valutazione solo
tratti prossimali ileo

Test indiretti

- H₂ e CH₄ Breath Test glucosio
- H₂ e CH₄ Breath Test lattulosio

Meno fastidiosi

Esplorano porzioni
maggiori

H₂ e CH₄ Breath Test al lattulosio

- Test non invasivo e di semplice esecuzione per la diagnosi di dismicrobismo intestinale.
- Il principio sul quale si basa il Breath Test consiste nell'aumento dei livelli di escrezione respiratoria di H₂ e/o CH₄ in seguito alla fermentazione glucidica operata dalla flora batterica intestinale.

Gas cromatografo utilizzato per il test
Quintron BreathTracker™ DP Digital Microlyzer

H₂ e CH₄ Breath Test al lattulosio

Preparazione del paziente

Nelle ultime 4 settimane

- Non bisogna eseguire Colonscopia, Clisma opaco
- Non usare lassativi

Nelle ultime 2 settimane

- Non usare antibiotici, IPP, procinetici

Il giorno precedente

- Escludere dalla dieta pane, pasta, frutta, verdura
- Cibi permessi: riso, carne o pesce

Il giorno dell'esame

- Essere a digiuno
- Evitare il fumo prima e durante l'esecuzione del test

H₂ e CH₄ Breath Test al lattulosio

☞ Esecuzione del test

- t = 0' espirazione di controllo per ottenere valore basale
- Assunzione di 10 g di lattulosio in 250 ml di acqua
- Lettura dell'esperto ogni 30 minuti

- Prelievo, mediante una comune siringa da 50 cc, di un campione d'aria di circa 30 cc e successiva analisi mediante gascromatografo

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Negativo

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Positivo

Obesità, apparato digerente e ruolo dei nutrienti. Studio su 98 pazienti obesi sottoposti a trattamento endoscopico bariatrico.

<i>Introito di Nutrienti and Energia</i>	Unità	LARN	Tutti N = 98 (a)	età ≤ 35 aa n = 25 (b)	età >35, ≤45 y n = 39 (c)	età > 45 y n = 34 (d)
Proteine	g	65.9 ± 7.56	149.6 ± 37.4	148.9 ± 40.5	155.3 ± 41.6	143.7 ± 29.0
Proteine Animali	g	22.0 ± 2.52	90.4 ± 34.7	88.7 ± 36.6	93.5 ± 40.0	88.2 ± 26.5
Grassi Totali	g	64.3 ± 9.7	143.2 ± 40.5	143.2 ± 32.7	150.7 ± 49.6	134.6 ± 33.1
Grassi Saturi (SFA)	g	25.7 ± 3.9	<u>25.3 ± 10.7</u>	<u>25.3 ± 12.5</u>	<u>24.8 ± 11.3</u>	<u>25.0 ± 8.9</u>
Grassi Monoinsaturi (MUFA)	g	51.5 ± 7.8	<u>50.7 ± 13.7</u>	<u>47.9 ± 14.8</u>	<u>52.6 ± 16.0</u>	<u>50.7 ± 8.4</u>
Grassi Polinsaturi (PUFA)	g	18.0 ± 2.7	11.8 ± 5.1	17.8 ± 2.9	11.5 ± 6.0	10.1 ± 3.3
Acido α-Linolenico (ω-3)	g	1.3 ± 0.2	1.91 ± 2.6	3.0 ± 3.5	2.0 ± 2.9	1.01 ± 0.3
Acido Linoleico (ω-6)	g	5.1 ± 0.8	9.1 ± 4.4	9.9 ± 4.6	9.4 ± 5.3	8.1 ± 2.6
ω-6/ω-3		4.0	8.0 ± 3.7	7.0 ± 4.4	8.1 ± 3.7	8.5 ± 2.8
Colesterolo	mg	<300	367 ± 203	378 ± 228	402 ± 236	<u>319 ± 124</u>
Carboidrati Totali	g	392.7 ± 63.9	494.0 ± 124.6	489.0 ± 93.3	526.0 ± 152.4	460.8 ± 100.9
Carboidrati Semplici	g	74.1 ± 11.2	139.5 ± 66.0	139.0 ± 49.0	155.5 ± 83.5	121.5 ± 48.8
Fibra Alimentare	g	30	<u>28.6 ± 11.0</u>	<u>27.3 ± 9.2</u>	<u>28.8 ± 12.7</u>	<u>29.2 ± 10.3</u>
Proteine Energia	Kcal	264 ± 30	599 ± 149	595 ± 162	623 ± 164	575 ± 116
Grassi Energia	Kcal	578 ± 88	1290 ± 363	1288 ± 289	1359 ± 442	1211 ± 298
Carboidrati Energia	Kcal	1472 ± 240	1855 ± 465	1833 ± 350	1878 ± 566	1449 ± 259
Totale Energia	Kcal	2307 ± 337	3761 ± 783	3722 ± 638	3982 ± 935	2280 ± 379

OBESITÀ : TERAPIA

**Terapia
bariatrica**

**Bendaggio gastrico regolabile
ad inserimento laparoscopico**

B.I.B. (Bioenterics®)

Adjustable Balloon (Spatz®)

BAG (Heliosphere®)

ATIIP (EndogAst®)

Duo (Reshape®)