RIMONABANT: UN ANTAGONISTA CB1 PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITA'

SISTEMA DEGLI ENDOCANNABINOIDI

Plant-derived cannabinoid

Δ^9 -Tetrahydrocannabinol (THC)

Endogenous cannabinoids

Anandamide (AEA)

2-Arachidonoylglycerol (2-AG)

SISTEMA DEGLI ENDOCANNABINOIDI

Nel SNC gli endocannabinoidi sono sintetizzati durante i momenti di intensa attività neuronale ed esercitano un meccanismo di feedback negativo, poiché il rilascio postsinaptico di endocannabinoidi permette la loro interazione con i recettori CB presinaptici che inibiscono la liberazione di neurotrasmettitore – TRASMISSIONE RETROGADA –

Il recettore CB1 è localizzato prevalentemente nel cervello mentre il recettore CB2 prevalentemente in periferia.

SNC: ipotalamo, strutture limbiche, corteccia, ippocampo, cervelletto, gangli della base

Periferia: adipociti, sistema immunitario, tratto GI

Struttura dei recettori CB1 e CB2

CB1

CB2

SISTEMA DEGLI ENDOCANNABINOIDI

Endocannabinoids Formation and Inactivation

Gli endocannabinoidi sono prodotti a richiesta e sono metabolizzati velocemente. La loro attività è limitata nel tempo e nello spazio.

SISTEMA DEGLI ENDOCANNABINOIDI

Il sistema degli endocannabinoidi è un sistema generalmente silente. E' un sistema di ripresa dallo stress che viene attivato per ristabilire l'omeostasi dell'organismo.

RELAX: riduzione di ansia e dolore, abbassamento della temperatura, rilassamento muscolare, vasodilatazione e abbassamento della pressione

RIPOSO: inibizione del movimento e sedazione

AMNESIA: rimozione di memorie avverse, traumatiche

PROTEZIONE emozionale

APPETTITO: aumento dell'appetito e delle proprietà di gratificazione del cibo

OBESITA'

FUMO DI SIGARETTA

IPER-ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEGLI
ENDOCANNABINOIDI

CERVELLO

PERIFERIA

NUCLEO
ACCUMBENS

IPOTALAMO

ADIPOCITI

Aumento appetito e
aumento fumo di
sigaretta per aumento
gratificazione

Aumento appetito

Aumento accumulo di
grasso

ENDOCANNABINOIDI E CIRCUITI DELLA GRATIFICAZIONE

- L'antagonista CB1 RIMONABANT riduce l'assunzione di soluzione zuccherina e cibo palatabile nei ratti
- La somministrazione cronica di nicotina nei ratti induce un aumento di anandamide nel nucleo accumbens
- Se a ratti allenati ad autosomministrarsi nicotina viene dato rimonabant, i livelli di dopamina, che in condizioni normali aumentano in seguito alla somministrazione di nicotina, rimangono bassi

ENDOCANNABINOIDI E IPOTALAMO

Nell'ipotalamo i livelli di endocannabinoidi sono bassi subito dopo il pasto ed elevati durante il digiuno – ciò suggerisce che gli endocannabinoidi stimolino l'appetito

ENDOCANNABINOIDI E IPOTALAMO

Anandamide iniettata direttamente nell'ipotalamo aumenta il food intake. Questo effetto è bloccato da rimonabant

ENDOCANNABINOIDI E IPOTALAMO in animali obesi

In diversi modelli animali di obesità i livelli degli endocannabinoidi nell'ipotalamo sono elevati – il sistema è permanentemente iperattivato e causa iperfagia

TOPI CB1(-/-)

Topi che non hanno il recettore CB1 mangiano meno e hanno meno massa grassa

TOPI CB1(-/-)

Topi CB1(-/-) che mangiano quanto topi wt ingrassano meno....questo esperimento suggerisce effetti metabolici che non dipendono dall'assunzione di cibo

TOPI CB1(-/-)

Topi CB1(-/-) sono più magri e, se sottoposti a dieta grassa, ingrassano meno

RIMONABANT: RIDUZIONE DEL PESO CORPOREO INDIPENDENTE DALL'ASSUNZIONE DI CIBO

ENDOCANNABINOIDI E TESSUTO ADIPOSO

Il recettore CB1 è presente sugli adipociti

La stimolazione di CB1 stimola la lipogenesi. Questo effetto è bloccato da rimonabant

I recettori CB1 sono over espressi in adipociti di animali obesi

Rimonabant stimola negli adipociti la sintesi di ADIPONECTINA

L'adiponectina è un ormone prodotto dal tessuto adiposo. Livelli bassi nei soggetti obesi, livelli elevati nei soggetti normopeso. Un aumento dei livelli di adiponectina è associato a perdita di peso e riduzione dei livelli di insulina. L'adiponectina è bassa in pazienti con diabete di tipo 2. Bassi livelli di adiponectina sono associati a dislipidemia

OBESITA'

FUMO DI SIGARETTA

IPER-ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ENDOCANNABINOIDI

CERVELLO

PERIFERIA

NUCLEO ACCUMBENS

IPOTALAMO

ADIPOCITI

Aumento appetito e aumento fumo di sigaretta per aumento gratificazione

Aumento appetito

Aumento accumulo di grasso

RIMONABANT

Diminuzione ricerca di cibo e fumo di sigaretta

Diminuzione appetito

Diminuzione lipogenesi e aumento adiponectina – diminuzione peso, dislipidemia e resistenza a insulina

RIO: Rimonabant in Obesity Study

Lo studio Rimonabant In Obesity/Overweight (RIO) ha studiato l'efficacia e la sicurezza di rimonabant per la riduzione del peso corporeo e la riduzione dei rischi metabolici. Sono stati arruolati circa 13.000 pazienti sovrappeso nel mondo.

- **RIO Program in Obesity / Overweight**
(>6,600 patients enrolled)

RIO~North America – 2-year treatment

RIO~Europe – 2-year treatment

RIO~Lipids – 1-year treatment

RIO~Diabetes – 1-year treatment

- **STRATUS Program in Smoking Cessation**
(>6,500 patients enrolled)

STRATUS~US – 10-week treatment

STRATUS~Europe – 10-week treatment

STRATUS~worldwide – 1-year treatment

LO STUDIO RIO IN EUROPA

CRITERI DI INCLUSIONE:

- Età > 18
- Maschi e femmine
- BMI > 30
- Peso stabile
- Seguire il regime ipocalorico durante le 4 settimane con placebo
- Assenza di diabete

LO STUDIO RIO IN EUROPA

Weight (kg)

Completers

Waist (cm)

Weeks

Weeks

ITT LOCF

placebo: - 1.8 kg
 5 mg: - 3.4 kg (p = 0.002 vs. placebo)
 20 mg: - 6.6 kg (p < 0.001 vs. placebo)

ITT LOCF

placebo: - 2.4 cm
 5 mg: - 3.9 cm (p = 0.002 vs. placebo)
 20 mg: - 6.5 cm (p < 0.001 vs. placebo)

— Placebo — Rimonabant 5mg — Rimonabant 20mg

LO STUDIO RIO IN EUROPA

Weight loss $\geq 5\%$

Weight loss $\geq 10\%$

LO STUDIO RIO IN EUROPA

HDL-cholesterol

Completers

Triglycerides

Weeks

ITT LOCF

Placebo : 13.4 %
 5 mg : 16.2 % (p=0.048 vs. placebo)
 20 mg : 22.3 % (p < 0.001 vs. placebo)

Weeks

ITT LOCF

Placebo : 8.3 %
 5 mg : 5.7 % (ns vs. placebo)
 20 mg : -6.8 % (p < 0.001 vs. placebo)

LO STUDIO RIO IN EUROPA

LO STUDIO RIO IN EUROPA

Percentuale di pazienti con sindrome metabolica

LO STUDIO RIO IN EUROPA

SICUREZZA:

Da questo studio non sono emersi particolari problemi di sicurezza, la maggior parte degli effetti collaterali sono stati blandi e transitori

Side Effect (%)	Rimonabant 20 mg	Rimonabant 5 mg	Placebo
Nausea	13.7	6.0	5.2
Dizziness	9.3	8.1	5.2
Diarrhea	8.2	7.3	4.6
Vomiting	5.2	2.5	1.6

LO STUDIO RIO-LIPIDS

Pazienti obesi con dislipidemia non trattata

Percentuale di pazienti che ha perso il 10% del peso corporeo

LO STUDIO RIO-LIPIDS

Pazienti obesi con dislipidemia non trattata

RIMONABANT – IL PRIMO ANTAGONISTA CB1 APPROVATO COME FARMACO

European Medicines Agency

London 30 January 2009
EMA/39457/2009

PUBLIC STATEMENT ON

**Acomplia
(rimonabant)**

WITHDRAWAL OF THE MARKETING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION

On 19 June 2006, the European Commission granted a marketing authorisation valid throughout the European Union for the medicinal product Acomplia (rimonabant), indicated as an adjunct to diet and exercise for the treatment of obese patients ($\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$), or overweight patients ($\text{BMI} > 27 \text{ kg/m}^2$) with associated risk factor(s), such as type 2 diabetes or dyslipidaemia.

On 13 November 2008, the marketing of Acomplia was suspended in all the Member States in which the product was being marketed.

On 5 December 2008, the marketing authorisation holder (MAH) responsible for Acomplia, sanofi-aventis, notified the European Commission of its decision to voluntarily withdraw its marketing authorisation. The MAH stated that no additional clinical data will now be available to lift the suspension of the marketing authorisation for Acomplia following its decision to discontinue the ongoing rimonabant clinical development program in all indications.

On 16 January 2009, the European Commission issued a decision to withdraw the marketing authorisation for Acomplia. Pursuant to this decision the European Public Assessment Report for Acomplia will be updated to reflect that the marketing authorisation is no longer valid.

Rimonabant è stato ritirato dal mercato per effetti importanti effetti collaterali a livello psichiatrico – ansia, depressione, tendenze suicide...