Seminario

Tecnologia del DNA e la genomica

Biologia Applicata a.a 2019-2020
Università di Ferrara

Dott.ssa Ilaria Bononi

Figura I.14.19.1 Tecniche diverse possono contribuire alla definizione della funzione genica, obiettivo della genomica funzionale.

DNA ricombinante

- La tecnologia del DNA ricombinante permette di unire in laboratorio il DNA di organismi diversi
- Permette di manipolare il DNA di un organismo allo scopo di produrre nuovi geni con nuove caratteristiche
- Sono numerose le applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Estrazione acidi nucleici

La separazione degli acidi nucleici dagli altri componenti cellulari e tissutali può essere effettuata mediante estrazione nella fase acquosa con una miscela di fenolo-cloroformio. Il pH del Fenolo influenza l'isolamento dei 2 diversi acidi nucleici

pH 4,5

pH 8

Estrazione del DNA

Figura I.14.1.1 (a) Fasi della purificazione del DNA da cellule di mammifero. Le cellule sono lisate mediante trattamento con agenti detergenti (SDS) e la miscela dei componenti cellulari così ottenuti viene trattata con fenolo/cloroformio. Dopo centrifugazione si ottiene la separazione della fase acquosa, contenente il DNA, dalla fase organica; le proteine denaturate rimangono all'interfase. Il DNA viene precipitato dalla fase acquosa in presenza di sali e alcol. Il DNA precipitato è raccolto per centrifugazione e ridisciolto. **(b) Il metodo della lisi alcalina per la purificazione di DNA plasmidico da cellule batteriche.**

Estrazione del DNA genomico da cellule eucariotiche

- Le membrane sono lisate con detergenti come SDS
- Si ottiene una miscela di: DNA, RNA, proteine, lipidi e carboidrati
- Separare il DNA dagli altri componenti
- Estrazione della fase acquosa con fenolo-cloroformio
 - Queste 2 sostanze organiche hanno una scarsa capacità di miscelarsi con soluzioni acquose:
 - aggiunte a un estratto cellulare
 - Vortex
 - Centrifuga
 - Si separano 2 fasi:

- Fase acquosa: contiene DNA e residui di RNA
- Fase intermedia: contiene le proteine (denaturate)
- Fase organica: contiene i lipidi

Estrazione del DNA genomico da cellule eucariotiche

Estrazione del DNA genomico da cellule eucariotiche

- Scopo: ottenere una soluzione acquosa di acido nucleico il più pura possibile
- Precipitazione con isopropanolo
- Si forma un precipitato che può essere raccolto sul fondo della provetta grazie a centrifugazione
- Risospensione in soluzione acquosa

Estrazione del DNA plasmidico

DNA plasmidico: sotto forma di DNA circolare covalentemente chiuso	Passaggi	DNA batterico: DNA cromosomale sotto forma lineare
	Metodo della lisi alcalina: SDS e NaOH
	SDS solubilizza proteine e fosfolipidi provocando la lisi
I filamenti di DNA del plsmide denaturato rimangono catenati	NaOH denatura il DNA cromosomale, plasmidico e le proteine	I frammenti di DNA cromosomale lineari si dissociano
	RNAsi degrada l'RNA
Mantenuto covalente mente chiuso può rinaturare in modo corretto e rimanere in soluzione I fasmrmmnti catenati del palsmid nrianturano	Neutralizzazione con KAc: l'elevata conc di sale provoca la precipitazione di SDS+ proteine denaturate + debrii + DNA genomico	I frammenti di DNA cromosomali aggregano
Rimane nel surnatante	Centrifugazione	Precipita nel pellet insieme a tutti gli altri contaminanti
Il DNA plasmidico si lega alla resina	Passaggio in colonnina con matrice a scambio ionico	I frammenti che restano non sono trattieneuti dalla resina
Il DNA plasmidico si stacca dalla alla resina e viene raccolto in soluzione	Eluizione dalla resina con un tampone ad altra conc salina	

Estrazione del DNA mediante kits

Figure 3. Fully automated nucleic acid purification using QIAamp genomic DNA kits. The QIAcube enables walkaway automation of many QIAGEN spin-column procedures. Visit www.qiagen.com/MyQIAcube for more information.

www.qiagen.com/MyQIAcube

QIAamp Procedures

Figure 5. Freedom from laborious manual tasks. The QIAcube is equipped with an automated centrifuge and pipetting system. No manual handling steps are required during the QIAcube run.

Estrazione di DNA da siero

Low pH

High pH

Range di concentrazione ottenute al
NanoDrop: **1-50 ng/ μ l**

Estrazione del RNA

- RNA: più sensibile del DNA all'attacco da parte di endonucleasi
- Durante la lisi del campione biologico devono essere inattivate tutte le RNAsi endogene
- Campione fresco
- Lisi con isotiocianato di guanidina o fenolo: con alto potere denaturante delle proteine

- Strumenti privi di RNAsi

- Trattamento con DNAsi per evitare contaminazioni da DNA genomico

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Taglio del DNA con enzimi di restrizione

Microorganismo	Abbreviazione	Sequenza 5' → 3' 3' → 5'
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> H	Bam HI	G ⁺ G A T C C C C T A G _↓ G
<i>Brevibacterium albidum</i>	Bal I	T G G ⁺ C C A A C C _↓ G G T
<i>Escherichia coli</i> RY13	Eco RI	G ⁺ A A T T C C T T A A _↓ G
<i>Haemophilus aegyptius</i>	Hae II	Pu G C G C ⁺ Py Py _↓ C G C G Pu
<i>Haemophilus aegyptius</i>	Hae III	G G ⁺ C C C C _↓ G G
<i>Haemophilus haemolyticus</i>	Hha I	G C G ⁺ C C _↓ G C G
<i>Haemophilus influenzae</i> R _d	Hin d II	G T Py ⁺ Pu A C C A Pu _↓ Py T G
<i>Haemophilus influenzae</i> R _d	Hin d III	A ⁺ A G C T T T T C G A _↓ A
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	Hpa I	G T T ⁺ A A C C A A _↓ T T G
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	Hpa II	C ⁺ C G G G G C _↓ C
<i>Providentia stuartii</i> 164	Pst I	C T G C A ⁺ G G _↓ A C G T C
<i>Streptomyces albus</i> G	Sal I	G ⁺ T C G A C C A G C T _↓ G
<i>Xanthomonas oryzae</i>	Xor II	C G A T C ⁺ G G _↓ C T A G C

Taglio del DNA con enzimi di restrizione

Enzyme	Recognition site	Type of cut end
<i>EcoRI</i>	G [↓] A—A—T—T—C C—T—T—A—A [↑] G	5'-phosphate extension
<i>BamHI</i>	G [↓] G—A—T—C—C C—C—T—A—G [↑] G	5'-phosphate extension
<i>PstI</i>	C—T—G—C—A [↓] G G [↑] A— — — — —T—C	3'-hydroxyl extension
<i>Sau3AI</i>	[↓] G—A—T—C C—T—A—G [↑]	5'-phosphate extension
<i>PvuII</i>	C—A—G [↓] C—T—G G—T—C [↑] G—A—C	Blunt end
<i>HpaI</i>	G—T—T [↓] A—A—C C—A—A [↑] T—T—G	Blunt end
<i>HaeIII</i>	G—G [↓] C—C C—C [↑] G—G	Blunt end
<i>NotI</i>	G [↓] C—G—G—C—C—G—C C—G—C—C—G—G—C [↑] G	5'-phosphate extension

Taglio del DNA con enzimi di restrizione

Figura 15-1
Taglio del DNA con un
enzima di restrizione

Molti enzimi di restrizione, come *Hind*III, tagliano il DNA a livello di sequenze di basi palindromiche, producendo due estremità complementari, dette "sticky ends" o "estremità coesive". Le frecce nere indicano i siti di taglio dell'enzima.

Taglio del DNA con enzimi di restrizione

1 *EcoRI* taglia i due filamenti di un DNA in due punti diversi, a livello di una sequenza di riconoscimento palindroma.

DNA

5' **CGATCCAGGAATTCATCCAGCC** 3'
3' **GCTAGGTCCTTAAGTAGGTCGG** 5'

EcoRI taglia a livello delle due frecce rosse

AGGCTCTAGAATTCTTCTAGCT
TCCGAGATCTTAAGAAGATCGA

CGATCCAGG **AATTCATCCAGCC**
GCTAGGTCCTTAA **GTAGGTCGG**

AGGCTCTAG **AATTC**TTCTAGCT
TCCGAGATCTTAA **GAAGATCGA**

CGATCCAGGAATTCTTCTAGCT
GCTAGGTCCTTAAGAAGATCGA

3 Le estremità adesive possono unirsi mediante legami idrogeno con estremità adesive complementari derivanti da altri DNA; il **DNA ricombinante** che ne risulta può essere saldato dall'azione della DNA ligasi.

2 I due frammenti separati del DNA portano appendici di basi non appaiate, che costituiscono "estremità adesive".

Taglio del DNA con enzimi di restrizione

1 In una vaschetta per elettroforesi, nello spazio compreso fra due elettrodi si prepara un gel di agarosio sospeso in una soluzione tampone.

2 Una serie di piccoli infossamenti nel gel (pozzetti) viene riempita con soluzioni di DNA.

Enzima 1

3 L'enzima di restrizione 1 taglia il DNA una sola volta, generando due frammenti A e B.

Enzima 2

4 L'enzima di restrizione 2 taglia il DNA una sola volta, ma a livello di un sito di restrizione diverso.

Enzimi 1 + 2

5 Se si usano entrambi gli enzimi di restrizione, il DNA viene tagliato in due punti.

6 Dopo un periodo di incubazione con l'enzima, ogni campione viene caricato in un diverso pozzetto del gel.

7 Nel migrare verso l'elettrodo positivo, i frammenti di DNA più brevi si muovono più velocemente (quindi arrivano più lontano) di quelli più lunghi.

Taglio del DNA con enzimi di restrizione

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- **Elettroforesi**
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Elettroforesi su gel

(b)

Figura 18.34 Separazione di frammenti di restrizione di DNA con elettroforesi su gel. (a) Il DNA è incubato con un enzima di restrizione, che lo taglia in frammenti. La miscela di frammenti è introdotta in un pozzetto su una lastra di agarosio e viene applicata corrente. Le molecole di DNA cariche negativamente migrano verso l'elettrodo positivo e separate in base alla dimensione. (b) Tutti i frammenti di DNA presenti in un gel possono essere rivelati immergendo il gel in una soluzione di bromuro di etidio e osservandolo sotto una luce ultravioletta. (B: PHILLIPE PLAILLY/ SCIENCE PHOTO LIBRARY/PHOTO RESEARCHERS, INC.)

1. SEPARAZIONE DI MACROMOLECOLE IN BASE ALLA LORO CARICA

Quando una molecola carica viene posta in un campo elettrico, essa migrerà verso l'elettrodo dotato di carica opposta .

DNA ed RNA essendo carichi negativamente si muoveranno verso il polo positivo (anodo).

catodo

anodo

**RNA e DNA sono
carichi negativamente**

Elettroforesi

* La gel elettroforesi analitica analizza la composizione, qualità, quantità di un campione di acido nucleico

Figura I.14.2.1 Gel elettroforesi in agarosio. L'agarosio disciolto è colato in uno stampo che contiene un pettine. Dopo che il gel si è formato, il pettine è rimosso per creare i pozzi nei quali saranno caricati i campioni di DNA. Si applica quindi una corrente elettrica per spostare il DNA carico negativamente verso l'elettrodo positivo. Le piccole molecole di DNA generalmente migrano attraverso il gel con una velocità superiore rispetto a quelle più grosse.

Permette la separazione di frammenti di DNA/RNA da una miscela complessa

E' una tecnica fondamentale per:

- l'analisi (elettroforesi *analitica*)*
- la purificazione degli acidi nucleici (elettroforesi *preparativa*)

Elettroforesi

METODO DI RICERCA

Perché si usa?

L'elettroforesi su gel separa molecole, come gli acidi nucleici, sulla base della loro dimensione e carica mentre migrano attraverso un campo elettrico.

Come funziona?

- 1 Il gel è preparato versando una soluzione di agarosio o poliacrilamide su un supporto di vetro o di Plexiglas in un modo da formare uno strato sottile. Quando il gel si è solidificato, i campioni, costituiti da una miscela di macromolecole (in questo caso, frammenti di DNA di diversa lunghezza) sono disposti nei pozzetti preparati ad un'estremità del gel.

- 2 Quando al gel è applicata una corrente elettrica, le molecole di DNA, che hanno carica negativa, si muovono dal polo negativo verso il polo positivo. I frammenti più piccoli avanzano più rapidamente e percorrono una distanza maggiore. Le bande di DNA a questo stadio non sono visibili.

- 3 Questo gel contiene frammenti di DNA separati per elettroforesi. Il gel è colorato con bromuro di etidio, un colorante che lega il DNA ed è fluorescente quando esposto a luce UV.

FIGURA 15-8 L'elettroforesi su gel

SCHEMA APPARATO PER ELETTROFORESI IN GEL DI AGAROSIO

ELETTROFORESI IN GEL DI AGAROSIO

Loading dye aiuta il caricamento del campione nel pozzetto del gel. Contiene glicerolo, **Blu di bromofenolo** e **Blu di xilencianolo** che migrano nel gel a velocità diversa.

ELETTROFORESI IN GEL DI AGAROSIO

Loading dye aiuta il caricamento del campione nel pozzetto del gel. Contiene glicerolo, **Blu di bromofenolo** e **Blu di xilencianolo** che migrano nel gel a velocità diversa.

ELETTROFORESI IN GEL DI AGAROSIO

Loading dye aiuta il caricamento del campione nel pozzetto del gel. Contiene glicerolo, **Blu di bromofenolo** e **Blu di xilencianolo** che migrano nel gel a velocità diversa.

METODO: FORMAZIONE DEL GEL DI AGAROSIO

1. Si scioglie l'agarosio in polvere in una soluzione tampone a 100°C
2. Alla soluzione d'agarosio sciolta vi si aggiunge **Etidio Bromuro (EtBr)** o altro intercalante FLUORESCENTE

3. Si versa l'agarosio sciolto nella vaschetta elettroforetica

4. Quando il gel è gelificato, Si levano "i pettini"

a. Casting tray for making gel slab

b. Agarose solution poured into casting tray

c. Comb that forms

2. SEPARAZIONE DI MACROMOLECOLE IN BASE ALLE LORO DIMENSIONI

DNA ed RNA migreranno a seconda del peso molecolare (paia di basi, bp)

Effetto "setaccio" in un gel uniforme (poliacrilamide, agarosio)

Etidio Bromuro (EtBr):

Colorante fluorescente
assorbe la luce UV a 300 nm
dando colore giallo-arancio

Permette di
A. visualizzare, il campione

B. quantificare il campione
L'intensità della fluorescenza
è, infatti, proporzionale alla
quantità del campione!!!

Figura 2.12. Il legame dell'etidio bromuro al DNA. L'etidio bromuro è una molecola planare in grado di intercalarsi tra le basi impilate della doppia elica del DNA. Il legame distorce la doppia elica ed aumenta la sua lunghezza. Il DNA a cui è legato l'etidio bromuro emette fluorescenza se è illuminato con luce ultravioletta.

E' necessario avere un marcatore di peso molecolare noto, con frammenti di pesi molecolari noti.

(b)

Taglia (bp)	Distanza di migrazione (mm)
10000	12.00
8000	12.85
6000	14.55
5000	16.12
4000	18.24
3500	19.74
3000	21.86
2500	23.97
2000	27.32
1500	31.72
1000	38.79
750	43.29
500	50.25
250	59.35

La distanza di migrazione è inversamente proporzionale alle dimensioni della molecola (ovvero alle sue paia di basi ; bp)

Figura 2.13. Migrazione dei frammenti di DNA attraverso un gel di agarosio. (a) Un gel di agarosio che mostra la separazione di frammenti di DNA a dimensione nota. (b) La dimensione di un frammento di DNA e la sua distanza di migrazione nel gel. (c) Grafico della relazione tra la dimensione dei frammenti e la distanza di migrazione costruito con i risultati mostrati in (b), che mostra come la relazione tra distanza di migrazione e lunghezza dei frammenti non sia lineare. (d) Grafico della relazione tra il log della dimensione dei frammenti e la distanza di migrazione, che mostra l'esistenza di una precisa correlazione inversa tra i due parametri.

Separazione in gel d'agarosio di molecole di RNA in condizioni denaturanti

RNA Samples in Denaturing Agarose Gel

Per ottenere una buona separazione dei pesi molecolari durante la corsa nel gel, l'RNA deve essere **denaturato**, ossia le molecole devono essere liberate sia da appaiamenti con altre molecole sia da strutture secondarie intramolecolari.

La denaturazione si ottiene con un trattamento termico a 90-95°C) il campione e aggiungendo **formaldeide** al gel. Anche il loading dye contribuisce alla denaturazione poichè contiene **formaldeide** e **formammide**.

Elettroforesi di Acidi Nucleici in gel

**Permette la separazione di frammenti di DNA/RNA
da una miscela complessa**

E' una tecnica fondamentale per:

- **l'analisi (elettroforesi *analitica*)***
- **la purificazione degli acidi nucleici (elettroforesi *preparativa*)**

* La gel elettroforesi analitica analizza la composizione , qualità, quantità di un campione di acido nucleico

Il DNA colorato con bromuro di etidio emette una fluorescenza di colore rosso-arancio se sottoposto a luce UV

ELETTROFORESI IN GEL DI AGAROSIO

Consente la separazioni di molecole di grandi dimensioni: 0.1 - 20 kb

Concentrazione
di agarosio

0.8%	:	0.5	-	20 kb
2%	:	0.1	-	3 kb

Risoluzione

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- **Generazione DNA ricombinante**
- **Clonaggio**
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Generazione del DNA ricombinante

Generazione del DNA ricombinante Plasmide

Generazione del DNA ricombinante

Plasmide

Figura 15-3 Plasmide

Questo vettore plasmidico presenta molte caratteristiche utili. È stato costruito combinando frammenti di DNA isolati da plasmidi, geni di *E. coli* e geni di lievito. Le due origini di replicazione, una *E. coli* e una per il lievito, *Saccharomyces cerevisiae*, gli permettono di replicarsi indipendentemente nei due tipi di cellule. Le sigle nella circonferenza esterna indicano i siti per enzimi di restrizione che tagliano il plasmide solo ed esclusivamente in quella posizione. Sono mostrati anche i geni per la resistenza agli antibiotici ampicillina e tetraciclina e il gene *URA-3* di lievito. Il gene *URA-3* è utile quando si trasformano le cellule di lievito che sono prive di un enzima necessario per la sintesi dell'uracile perché permette di identificare quelle che hanno ricevuto il plasmide. Le cellule che incorporano il plasmide divengono capaci di crescere in un mezzo privo di uracile.

Generazione del DNA ricombinante

METODO DI RICERCA

PERCHÉ SI USA? Un plasmide trasporta DNA estraneo in una cellula ospite batterica, dove sono fatte molte copie del gene di interesse, quando la cellula batterica si replica. Queste copie vengono utilizzate in molti tipi di ricerca, per esempio, per ottenere il prodotto genico codificato dal DNA estraneo.

COME FUNZIONA?

Figura 15-2 Inserimento di DNA estraneo (gene di interesse) in un vettore di clonaggio (in questo esempio, un plasmide batterico) per generare DNA ricombinante

Generazione del DNA ricombinante

Impiego del DNA ricombinante

Il primo farmaco da biotecnologie è stato l'insulina umana ricombinante. La principale attività dell'insulina è la regolazione del metabolismo glucidico.

Nel batterio *Escherichia coli* è stato introdotto un gene codificante per l'insulina, isolato a partire da cellule umane. Dopo questa manipolazione, il batterio ricombinante produce un'insulina assolutamente identica a quella secreta dalle cellule del pancreas umano.

Piante transgeniche

Per gent. conc. di Monsanto Corporation

(a) Si noti la bassa resa produttiva di piante di granoturco normali utilizzate come controlli.

Per gent. conc. di Monsanto Corporation

(b) Piante di granoturco modificate geneticamente sopportano meglio la siccità rispetto a quelle normali.

Piante transgeniche

Queste piante transgeniche crescono bene in acqua salata.

Le piante normali nell'acqua salata appassiscono.

Animali transgenici

Per gent. conc. di GloFish®

Pesci transgenici (GloFish®). Questi pesci di acquario emettono fluorescenza di colore verde, rosso o giallo in quanto i ricercatori hanno inserito nel loro genoma un gene codificante una proteina fluorescente, normalmente presente nelle meduse e nei coralli.

Animali transgenici

Animali transgenici

R.L. Bonstar, University of Pennsylvania Medical School

Figura 15-14 Un topo transgenico

Il topo sulla *destra* è normale, mentre quello sulla *sinistra* è transgenico ed esprime l'ormone della crescita di ratto.

Pentti Vänskä, Helsingin Sanomat International Edition

Figura 15-15 Mucche transgeniche “pharm”

Queste mucche contengono il gene umano che codifica per la lattoferrina, una proteina che si trova nel latte materno umano e in alcune secrezioni, come le lacrime, la saliva, la bile e i succhi pancreatici. La lattoferrina rappresenta una delle linee di difesa del sistema immunitario contro gli organismi patogeni. Queste mucche transgeniche secernono la lattoferrina umana nel proprio latte.

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- **Costruzione libreria genomica**
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Costruzione di libreria genomica

Costruzione libreria genomica

METOD

Perché si usa?

Una libreria genomica è una raccolta di tutti i frammenti di DNA del genoma di un organismo; una libreria cromosomica è una raccolta di tutti i frammenti di DNA di un cromosoma specifico. Ciascun frammento di DNA viene "conservato" in un clone di cellule batteriche ricombinanti. Gli scienziati usano librerie genomiche e cromosomiche per isolare e studiare geni.

Come funziona?

genoteca

FIGURA 15-4 Costruzione di una libreria genomica o di una cromosomica

A Per genoteca di DNA

DNA genomico

1a Il DNA genomico viene tagliato in piccoli frammenti.

2 Un vettore plasmidico si unisce a un frammento, formando un DNA ricombinante.

Cellule del batterio *E. coli*

3 Le cellule di *E. coli* vengono trasformate dai plasmidi ricombinanti.

Genoteca

4 Ogni colonia della genoteca contiene un frammento del DNA genomico originale, o un cDNA derivato da un mRNA.

B Per genoteca di mRNA

mRNA

1b Gli RNA messaggeri sono copiati in cDNA mediante la trascrittasi inversa.

Genoteca di cDNA

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Impiego di sonde di acido nucleico

METODO DI RICERCA

Perché si usa?

Una sonda radioattiva di acido nucleico rivela la presenza di sequenze complementari di DNA in una libreria genomica.

Come funziona?

1 I cloni di una libreria genomica sono conservati nei pozzetti di una piastra come quella mostrata a lato. Una libreria costituita dall'intero genoma di un organismo occupa molte di queste piastre, che sono chiuse con un coperchio e conservate impilate una sull'altra.

2 Le cellule di ciascun clone sono trasferite in una posizione specifica di una membrana di nylon o di nitrocellulosa. La membrana è quindi trattata con agenti che provocano la lisi delle cellule batteriche per rilasciare i plasmidi con i frammenti di DNA genomico.

3 La sonda marcata con traccianti radioattivi è aggiunta alla membrana e si appaia con le sequenze nucleotidiche ad essa complementari (in questo caso, il gene d'interesse).

4 L'ibridazione è rivelata ponendo la membrana contro una lastra per raggi X, che è in seguito sviluppata. Il tracciante radioattivo legato alla sonda produce sulla lastra una macchia scura che rivela la posizione del clone recante il gene d'interesse.

FIGURA 15-5 Uso di una sonda di acido nucleico per identificare una specifica sequenza di DNA in una libreria genomica

• Southern Blotting

METODO DI RICERCA

Perché si usa?

La tecnica del Southern blotting consiste nel trasferimento su un filtro dei frammenti di DNA separati per elettroforesi, con il mantenimento delle stesse posizioni che occupavano sul gel. I frammenti possono essere così ibridati con sonde radioattive complementari.

Come funziona?

FIGURA 15-9 La tecnica del Southern blotting

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- **Fingerprinting**
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Il DNA fingerprinting presenta numerose applicazioni

Le brevi ripetizioni in tandem (Short tandem repeats, STR) (microsatelliti) sono marcatori molecolari costituiti da brevi sequenze di DNA ripetuto (200 nucleotidi) con uno schema semplice ripetuto esempio GTGTGT oppure CAGCAGCAG). Le STR sono altamente polimorfiche poichè variano in lunghezza da individuo ad individuo: questa caratteristica le rende utili per identificare gli individui

Figura 15-13 Fingerprinting del DNA

Questi fingerprint di DNA mostrano il DNA derivante dalla scena di un crimine (al centro) insieme ai profili del DNA di tre individui sospettati. Riuscite a individuare il profilo di DNA del sospettato che corrisponde al campione di sangue ritrovato sulla scena del crimine?

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

Metodo di Sanger

(o metodo a terminazione di catena)

Dideoxinucleotidi trifosfati (ddNTP) o Terminatori di catena

Normal nucleotides:

Dideoxy Chain Terminators:

Dideossinucleotide (ddNTP) e deossinucleotide

I **dideossinucleotidi** o **ddNTP**, sono **deossiribonucleotidi** sintetici che presentano lo zucchero **desossiribosio** privo del gruppo ossidrilico in posizione 3'.

dNTP deossiribonucleotidi sono i monomeri del DNA

• Sequenziamento del DNA

METODO DI RICERCA

Perché si usa?

Il metodo di terminazione della catena con dideossinucleotidi è un sistema rapido ed efficiente per sequenziare il DNA.

Come funziona?

- 1 Per sequenziare un frammento di DNA, si utilizzano quattro diverse miscele di reazione, ognuna contenente una piccola quantità di un singolo dideossinucleotide, per esempio ddATP. Ogni miscela di reazione include anche una quantità maggiore dei quattro deossinucleotidi normali (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), primer marcati radioattivamente e DNA polimerasi.

- 2 L'incorporazione causale del dideossi-ATP nel filamento in crescita genera una serie di frammenti di DNA più piccoli e tutti terminanti in una qualsiasi delle posizioni in cui avrebbe dovuto collocarsi una adenina nella duplicazione del filamento originario. Queste posizioni corrispondono a quelle che nel filamento stampo contengono timina.

- 3 I prodotti radioattivi di ogni miscela sono separati mediante elettroforesi su gel e localizzati mediante autoradiografia. La sequenza dei nucleotidi del frammento di DNA neo-sintetizzato viene così letta direttamente dal film fotografico (5'→3'). La sequenza del filamento stampo è la sua complementare (3'→5').

- 4 Una lastra fotografica di un gel di sequenziamento. Le quattro corsie rappresentano rispettivamente le miscele di reazione contenenti i quattro diversi dideossinucleotidi di A, C, G e T.

FIGURA 15-10 Il metodo di sequenziamento del DNA basato sulla terminazione del filamento con dideossinucleotidi

FIGURA 15-11 Un piccolo segmento dell'elettroferogramma con i risultati di un sequenziamento automatizzato del DNA

Il computer produce la serie di picchi illustrata, mediante la lettura delle bande fluorescenti sul gel. La base adenina è colorata in verde, la guanina in nero, la citosina in blu e la timina in rosso. La sequenza precisa del DNA, decifrata dal computer, appare al margine superiore della stampa.

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- PCR:
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

• DNA microarray

METODO DI RICERCA

Perché si usa?

Il DNA microarray è una metodica che rivela i livelli di espressione genica di centinaia o addirittura migliaia di geni specifici in diversi tipi di cellule. Questa tecnica aiuta gli scienziati a comprendere quali geni sono attivi (o inattivi) ad esempio in cellule trattate con un farmaco specifico rispetto a cellule non trattate, di controllo.

Come funziona?

- 1 Preparazione del microarray.
Ciascun cerchietto contiene molte copie di un specifico cDNA a singolo filamento.

Cellula trattata

Copia di cDNA dell'mRNA

- 3 Marcatura di ciascun cDNA con molecole fluorescenti di colore diverso.

Cellula non trattata (controllo)

Copia di cDNA dell'mRNA

cDNA dei tessuti tumorali cDNA normale

1 Si prepara il cDNA totale del tessuto tumorale e del tessuto normale.

2 Entrambi gli insiemi di cDNA vengono fatti ibridare con un *microarray* contenente DNA che deriva da geni dal valore diagnostico. Ogni punto corrisponde a un particolare gene.

Pattern associato a una prognosi favorevole

Pattern associato a una prognosi sfavorevole

3 Il colore di un punto indica il livello di espressione del gene nel tessuto tumorale rispetto alla sua espressione nel tessuto normale. Il pattern dei punti colorati fornisce informazioni importanti sul tumore.

Un punto verde indica che nel tessuto tumorale l'espressione del gene è più bassa del normale.

Un punto rosso indica che nel tessuto tumorale l'espressione del gene è più alta del normale.

Un punto giallo indica che nel tessuto tumorale l'espressione del gene non è diversa che nel tessuto normale.

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- **PCR:**
 - **Qualitativa**
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - ddPCR

PCR

La reazione a catena della polimerasi (in inglese: Polymerase Chain Reaction), comunemente nota con l'acronimo PCR, è una tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione (amplificazione) di sequenze di acidi nucleici dei quali si conoscano le sequenze nucleotidiche iniziali e terminali.

L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere in vitro molto rapidamente la quantità di materiale genetico necessaria per le successive applicazioni.

L'invenzione della PCR

- Ideata da Kary Mullis nel 1983
- La prima pubblicazione è apparsa nel 1985
- Premio Nobel per la chimica nel 1993

La PCR è basata sulla complementarità delle basi

Com'era l'analisi genetica prima della PCR?

- Il Southern blotting (1975) permetteva un'analisi approssimativa dei geni (RFLPs, inserzioni & delezioni)
- Il sequenziamento del DNA (1978) richiedeva che i geni venissero prima clonati in appositi vettori (plasmidi o fago λ)
- La costruzione di genoteche e lo screening potevano richiedere molti mesi e le genoteche dovevano essere preparate per ciascun individuo analizzato

DNA polimerasi di *Thermus aquaticus*

Thermus aquaticus è un batterio termofilo isolato per la prima volta nelle pozze di acqua calda del parco nazionale di Yellowstone, negli (Stati Uniti). È divenuto famoso nel campo della biologia molecolare dopo la sensazionale invenzione di Kary Mullis, la reazione a catena della polimerasi (PCR), che ha rivoluzionato il modo di fare ricerca in questo ed in molti altri settori e che portò l'eccentrico scienziato al premio Nobel per la chimica nel 1993; la sua notorietà è dovuta alle caratteristiche di estrema termostabilità di un suo enzima, la DNA polimerasi (commercialmente detta Taq polimerasi), componente fondamentale della miscela di reazione nell'amplificazione del DNA per mezzo della PCR (che richiede numerosi cicli di riscaldamento per favorire la denaturazione del DNA).

Prima della sua scoperta, per effettuare l'amplificazione del DNA con tecniche di laboratorio, era necessario aggiungere nuovo enzima dopo ciascun ciclo di riscaldamento, favorendo così la possibilità di inquinamento del campione e non permettendo la completa automazione del processo.

Polymerase Chain Reaction - PCR

Ad ogni ciclo il numero di molecole di DNA “copiato” raddoppia

DNA

(singola molecola)

PCR

amplificazione

Molte
molecole

I cicli della PCR

- **30–35 cicli ciascuno comprendente:**
 - **denaturazione (95°C), 10-40 sec**
 - **annealing (50–65°C), 30-120 sec**
 - **polimerizzazione (68-72°C), il tempo dipende dalla lunghezza del frammento**

Quanto è potente la PCR?

- **La PCR può amplificare fino ad ottenere una quantità utilizzabile di DNA (visibile su gel) in meno di 2 ore**
- **Lo stampo di DNA non necessita di particolari purificazioni se il frammento da amplificare è di dimensioni ridotte (fino a 1000bp)**
- **Il prodotto della PCR può essere digerito con enzimi di restrizione, sequenziato o clonato**
- **La PCR può amplificare una singola molecola di DNA (es. uno spermatozoo)**

fase 1: DENATURAZIONE

La doppia elica di DNA stampo è aperta al calore

**DNA STRANDS ARE SEPARATED
BY HEATING**

fase 2:

ANNEALING

I primers si appaiano alle sequenze complementari sul DNA stampo

**UNATTACHED
PRIMERS**

55-60°C
54° C

**ANNEALED
PRIMERS**

fase 3: ESTENSIONE
La DNA polimerasi allunga gli inneschi e produce 2 nuove catene di DNA

IL PROCESSO SI RIPETE

THE PROCESS IS REPEATED.

1

2

3

4

Ad ogni ciclo il numero di molecole di DNA “copiato” raddoppia

1

2

3

4

5

• PCR

METODO DI RICERCA

Perché si usa?

In poche ore la PCR è in grado di amplificare quantità estremamente piccole di DNA generandone milioni di copie.

Come funziona?

La miscela di reazione iniziale include una piccolissima quantità di DNA a doppio filamento, i precursori del DNA (deossiribonucleotidi), specifici primer di acido nucleico e la *Taq* DNA polimerasi termostabile. La reazione di PCR coinvolge ripetuti cicli di denaturazione, attacco dei primer ed estensione del filamento, eseguita da enzimi che sfruttano l'appaiamento di basi complementari.

FIGURA 15-7 Amplificazione del DNA tramite la reazione di polimerizzazione a catena (PCR)

PCR :

Denaturation 94°C

(Andy Vierstraete 1999)

PCR MULTIPLEX

- permette l'analisi di più target contemporaneamente
- vengono usati miscele di primers o primers degenerati

PCR in situ

Il DNA o l'RNA vengono amplificati direttamente nelle cellule e nei tessuti morfologicamente intatti

Termociclatori

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- **PCR:**
 - Qualitativa
 - **RT-PCR: Formazione del cDNA**
 - Real time-PCR
 - ddPCR

• Formazione del cDNA

FIGURA 15-6 Formazione del cDNA

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- **PCR:**
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - **Real time-PCR**
 - ddPCR

Real Time PCR

La Real Time PCR permette in tempo reale di monitorare la reazione di PCR mediante emissione di fluorescenza

Viene stimata l'iniziale quantità di template di DNA

Basata sulla quantificazione di fluorescenza

Ct (ciclo soglia) è il ciclo soglia al di sopra del quale si ha l'esponenziale aumento della quantità di DNA prodotto per PCR.

Il ciclo soglia correla con il DNA iniziale

A concentrazione alta di DNA iniziale si ha un basso ciclo soglia.

Quantitative PCR

Definition: C_t value

C_t : Fractional cycle number at which the fluorescence intensity crosses the arbitrary threshold line.

- It is the parameter used for quantitation
- C_t value of 40 or more means no amplification and cannot be included in the calculations

Real-time PCR is kinetic

- Detection of “amplification-associated fluorescence” at each cycle during PCR
- No gel-based analysis at the end of the PCR reaction
- Computer based analysis of the cycle-fluorescence time course

Increasing
fluorescence

Linear plot

PCR cycle

Real Time PCR

TaqMan “real-time” quantitative PCR assay

Alcune Tecnologie del DNA

- Estrazione di acidi nucleici
 - » DNA
 - » RNA
- Taglio del DNA con enzimi di restrizione
- Elettroforesi
- Generazione DNA ricombinante
- Clonaggio
- Costruzione libreria genomica
- Impiego di sonde di acido nucleico
- Southern Blotting
- Fingerprinting
- Sequenziamento del DNA
- DNA microarray
- **PCR:**
 - Qualitativa
 - RT-PCR: Formazione del cDNA
 - Real time-PCR
 - **ddPCR**

Droplet Digital PCR (ddPCR)

Prima
1983

PCR
Qualitativa

Seconda
1996

Real-time PCR (RT-qPCR)
Quantificazione Relativa

Terza
2011

Droplet Digital PCR (dd PCR)
Quantificazione Assoluta

I Principi della Droplet Digital PCR

È una nuova tecnologia emergente che partiziona il campione in migliaia di piccole goccioline (droplet) indipendenti dividendo le molecole di acido nucleico in regioni distinte.

Metodi tradizionali

- ✓ Campione
- ✓ Primers
- ✓ Sonda Fluorescente
- ✓ DNA Polimerase
- ✓ dNTPs

In un unico sistema
omogeneo

VS

ddPCR

- ✓ Campione
- ✓ Primers
- ✓ Sonda Fluorescente
- ✓ DNA Polimerase
- ✓ dNTPs

Separati in circa
20.000 goccioline

Vantaggi!

- **Conta delle molecole**, con quantificazione assoluta del campione, espressa come n° di copie/uL
- Singola amplificazione per ogni molecola di DNA riducendo i problemi di competizione
- È **ultrasensibile e più accurata** e precisa rispetto alle precedenti tecniche, permettendo di identificare eventi rari
- Ha **molte applicazioni** tra cui l'individuazione e la quantificazione:
 - ✓ dei **patogeni** di basso livello
 - ✓ di sequenze genetiche rare
 - ✓ di **variazioni del numero di copie**
 - ✓ dell'espressione genica relativa in singole cellule

Sistema Bio-Rad QX200™ Droplet Digital PCR

Generatore Automatico di Droplet

Emulsiona il campione dividendo la reazione in migliaia di goccioline

Formazione della goccia

Cartridge

Termociclatore

Legge la fluorescenza delle singole droplet

Sealer

Sistema Bio-Rad QX200™ Droplet Digital PCR

Analisi dei Dati

Tabella dei
Dati Grezzi

Selettore di
Pozzetti

Interfaccia
Analisi dei
Dati

Opzioni Asse delle Y

Stampa Grafico

PCR

Applications

- Gene expression (and microarray validation).
- DNA target quantification (nuclear, mitochondrial, residual DNA in protein preps (QC)).
- SNP detection, Allele discrimination, Genotyping, Haplotyping
- DNA Methylation, Apoptosis
- Viral load assays, pathogen & GMO detection.
- Clinical Diagnostics (Cancer, Therapy Response)
- Static reads (“96-well fluorimeter”).

PCR

Real-Time PCR Applications II

- DNA damage (microsatellite instability) measurement
- radiation exposure assessment
- *in vivo* imaging of cellular processes
- mitochondrial DNA studies
- methylation detection
- detection of inactivation at X-chromosome
- linear-after-the-exponential (LATE)-PCR: a new method for real-time quantitative analysis of target numbers in small samples, which is adaptable to high throughput applications in clinical diagnostics, biodefense, forensics, and DNA sequencing