1 credito:
12 ore

1. Fisioterapia
2. Logopedia
3. Ortottica
4. Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica

Lauree Triennali Professioni Sanitarie
Programma del corso comune di Biologia Applicata
(AA 2017-2018)

Data	Ore di lezione	Argomenti
Mercoledì 11 Ottobre 2017 ore 14,30-16,30 Aula Acquario	2	Origine della cellula; Differenze procarioti ed eucarioti; Componenti chimici della cellula Macromolecole: zuccheri, lipidi
Venerdì 13 Ottobre 2017 ore 16,30-18,30 Aula Acquario	2	Macromolecole: proteine Macromolecole: acidi nucleici Organuli
Venerdì 20 Ottobre 2017 ore 14,30-18,30 Aula Canani	4	Replicazione Trascrizione
Mercoledì 25 Ottobre 2017 ore 16,30-18,30 Aula Acquario	2	Traduzione
Venerdì 10 Novembre 2017 ore 14,30-18,30 (scambio) Aula Acquario	2	Mitosi Meiosi
TOTALE ORE	12	

Dott.ssa Ilaria Bononi

LEZIONE 2 - PARTE 1

•COMPOSTI DEL CARBONIO: MACROMOLECOLE:

•ZUCCHERI

•ACIDI GRASSI

(oggetto della lezione precedente)

•PROTEINE

•NUCLEOTIDI

•COMPATTAMENTO DEL DNA

I componenti chimici di una cellula

Le cellule contengono 4 famiglie principali di piccole molecole organiche:

Struttura degli aminoacidi

Gli aminoacidi sono una variegata classe di molecole che hanno alcune proprietà in comune e si distinguono solamente in base alla catena laterale:

A pH fisiologico
 COOH ed NH_2 sono
ionizzati

Stereochimica degli amminoacidi

Il C α è legato a 4 diversi sostituenti, pertanto è un atomo di C **asimmetrico**; ciò fa sì che ciascun amminoacido esista in **2 forme isomeriche** (stereoisomeri) che possono essere orientate nello spazio secondo 2 conformazioni: **L e D**, l'una immagine speculare dell'altra (eccezione: la Gly)

Gli aa presenti nelle proteine sono tutti della serie L

Gli aminoacidi costituenti le proteine vengono classificati in 3 gruppi sulla base delle proprietà chimico-fisiche del loro radicale:

Polari ma privi di carica

Amminoacidi polari privi di carica

Apolari

Amminoacidi apolari

Ionizzabili:

acidi o basici

Amminoacidi acidi (carichi negativamente)

Amminoacidi basici (carichi positivamente)

aminoacidi

Le cellule umane e animali partendo da sostanze semplici possono sintetizzarne solo alcuni. Quelli che invece devono essere introdotti con la dieta si chiamano aminoacidi essenziali

questi sono i 20 aminoacidi che si trovano nell'organismo umano e che costituiscono le...

PROTEINE

Amminoacidi essenziali e non essenziali

L'organismo non è in grado di immagazzinare aa

Le cellule traggono elementi necessari alla sintesi di nuove proteine attingendo ad un **pool di amminoacidi** liberi che provengono da:

1. sintesi (aa non essenziali)
2. processi di assorbimento (aa essenziali: devono essere introdotti con la dieta)
3. dalla demolizione di proteine (riciclaggio)

Essenziali

Istidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Tryptofano
Valina

Non essenziali

Alanina
Arginina^a
Asparagina
Aspartato
Cisteina
Glutammato
Glutamina
Glicina
Prolina
Serina
Tirosina

^aArg: non essenziale, ma i bambini in crescita ne devono assumere anche con la dieta

Il legame peptidico

La reazione di condensazione che si realizza tra gli aa per formare i peptidi avviene tra il gruppo COOH del primo aa ed il gruppo NH₂ di quello seguente con perdita di H₂O

Le proteine sono polimeri di aa che si uniscono con un legame peptidico in una lunga catena

Il legame peptidico è una struttura planare e rigida: non è possibile effettuare rotazioni intorno al legame C-N

Struttura delle proteine

I polipeptidi hanno una precisa direzionalità, cioè una polarità strutturale:

- I polipeptidi sono sintetizzati dall'N-term al C-term
- la seq degli aa viene scritta nello stesso ordine

Organizzazione tridimensionale delle proteine

Le proteine sono **polimeri** di aa che si uniscono con un **legame peptidico** in una lunga catena che non rimane filamentosa, ma si ripiegano assumendo una **struttura tridimensionale** di tipo globulare che presenta una caratteristica conformazione per ognuna di esse.

Le proteine si dispongono in modo da stabilire il **maggior numero di interazioni** con il mezzo circostante, con atomi o gruppi appartenenti alla molecola stessa (interazioni **intramolecolari**) o a molecole circostanti (interazioni **intermolecolari**).

Legami deboli: legami H, interazioni elettrostatiche e forze di Van der Waals

La struttura tridimensionale delle proteine è stata semplificata e scomposta in vari livelli di organizzazione:

- Struttura primaria**
- Struttura secondaria**
- Struttura terziaria**
- Struttura quaternaria**

La struttura primaria delle proteine

è data dalla successione degli aminoacidi che compongono la proteina

La sequenza aa è **unica** per ogni tipo di proteina, e in ogni molecola di quella proteina la seq è rigorosamente **la stessa**

Sono state identificate molte **migliaia** di proteine diverse: ognuna ha una sua propria seq aa

Possono esistere infinite proteine **con identica composizione aa, ma con diversa sequenza**: sono pt diverse

La struttura secondaria delle proteine

Interessa tratti più o meno lunghi di una catena polipeptidica, che assumono un ripiegamento regolare e ripetitivo

Alfa elica

Beta foglietto

Entrambe queste strutture secondarie sono tenute insieme da legami idrogeno fra gruppi NH e CO dei legami peptidici

La struttura secondaria delle proteine: Struttura alfa-elica

Un' α -elica si forma quando una regione di una catena polipeptidica si avvolge su se stessa, con il gruppo CO di un legame peptidico che forma un **legame idrogeno** con il gruppo NH di un legame peptidico posto **4 residui più a valle** nella catena polipeptidica lineare

La struttura secondaria delle proteine: Struttura beta-foglietto

Si forma quando diversi filamenti di una catena polipeptidica si dispongono **parallelamente** gli uni agli altri. In ciascun filamento il gruppo NH e CO dei legami peptidici sono rivolti perpendicolarmente rispetto alla direzione della catena e formano legami-H con i gruppi NH e CO dei legami peptidici della catena affiancata. Ogni legame peptidico forma 2 legami-H

Le catene laterali degli aa sporgono al di sopra o al di sotto delle catene affiancate

Il β -foglietto si può formare fra parecchi filamenti polipeptidici, che possono essere:

paralleli

antiparalleli

b) catene parallele

c) catene antiparallele

La struttura secondaria delle proteine: Struttura beta-foglietto

La struttura terziaria delle proteine:

Legami deboli (o ponti disolfuro) fra **catene laterali di aa** che si trovano in regioni diverse della stessa seq primaria

Domini: strutture globulari compatte: unità base della struttura terziaria: combinazioni di α -elica e β -foglietto, connesse da regioni ad ansa: unità **funzionali** e strutturali della pt.

Pt con funzioni simili hanno domini simili

Il ripiegamento della pt non è casuale, è dettato dalla struttura primaria e dall'ambiente esterno:

aa **apolari** nella parte interna (forze di van der Waals)

aa **polari** esposti alla superficie (interazioni con H_2O)

Contrario per le proteine di membrana

La struttura quaternaria delle proteine

La struttura quaternaria consiste nelle **interazioni fra catene polipeptidiche diverse** in proteine composte da più di un polipeptide. L'associazione delle diverse catene è guidata dalla **stessa logica** che ha consentito il raggomitolamento nella struttura terziaria:

- legami deboli
- ponti disolfuro
- aa apolari e aa polari

Emoglobina:

Eterodimero costituito dall'aggregazione di 4 subunità uguali a 2 a 2.

La struttura delle proteine

I TRE LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE DI UNA PROTEINA

DOMINIO PROTEICO:

è l'unità strutturale base di una proteina. Il nucleo di ciascun dominio è composto in gran parte da una serie di foglietti β o a eliche o da un misto delle due a strutture.

proteina CAP

struttura secondaria

struttura terziaria

struttura quaternaria

MOTIVI
COMUNI
NELLE PROTEINE

motivo a forcina beta

Denaturazione e rinaturazione di una proteina

Il riscaldamento e il trattamento con un riducente disgregano la conformazione nativa denaturando la proteina

Agenti denaturanti:

- Fisici: calore, radiazioni
- Chimici: pH, urea, guanidina, ecc

Rompono i legami che stabilizzano le strutture **secondaria, terziaria e quaternaria**: si modifica la struttura tridimensionale senza modificare la seq aa

La denaturazione causa la **scomparsa dell'attività biologica** della proteina, ciò evidenzia chiaramente il legame tra attività biologica e struttura tridimensionale

La **rinaturazione** si accompagna alla ricomparsa di tutte le proprietà della proteina nativa, compresa l'attività biologica

Le proteine

Rinaturazione e ripiegamento delle proteine

Il riscaldamento e il trattamento con un riducente che rompe i legami disolfuro disgregano la conformazione nativa denaturando la proteina

Se la Rnasi denaturata viene poi riportata in condizioni native si ripiega spontaneamente nella sua conformazione nativa

Legami disolfuro

RNasi nativa

RNasi denaturata

RNasi nativa

La ribonucleasi (RNasi)

FUNZIONI DELLE PROTEINE (*proteios = di primaria importanza*)

Le cellule sono sostanzialmente formate da elementi proteici che costituiscono la maggior parte della loro **massa**, insieme all'acqua

Tuttavia le proteine non danno solo la forma e la struttura della cellula, ma eseguono anche quasi tutte le sue **funzioni**

1. **Enzimi** catalizzatori che accelerano la velocità delle reazioni chimiche
2. **Proteine strutturali** pt del citoscheletro, collagene, elastina, cheratina ecc.
3. **Carriers** proteine di trasporto inserite nella membrana citoplasmatica
4. **Proteine contrattili** assicurano la motilità delle cellule e degli organismi
5. **Ormoni proteici** es. ormoni ipotalamici, ipofisari, PTH, CT, insulina, glucagone
6. **Proteine di trasporto** es emoglobina del sangue
7. **Anticorpi** principale sistema di difesa degli organismi
8. **Proteine di deposito** deposito di materia o di energia (es, ovalbumina, caseina) o di particolari sostanze (la ferritina, deposito di ferro).
9. **Tossine**

Le proteine costituiscono lo *hardware* delle cellule.

Le macromolecole - proteine

Tra le 4 famiglie principali di piccole molecole organiche contenute nelle cellule, ora trattiamo gli **amminoacidi**.

Unendo semplicemente gli **amminoacidi** con **legami peptidici** (covalenti) in **lunghe catene** si formano le macromolecole cellulari denominate **proteine**

Le **reazioni chimiche** con cui vengono aggiunti gli **amminoacidi** alle **proteine** presentano importanti **caratteristiche comuni** alla polimerizzazione delle altre macromolecole (polisaccaridi, acidi nucleici).

La **proteina** si allunga applicando un nuovo **amminoacido** all'estremità di una catena polimerica in crescita mediante una **reazione di condensazione**, in cui una molecola di **H₂O** viene eliminata per ogni aminoacido aggiunto

In tutti i casi la reazione è catalizzata da **enzimi** che garantiscono l'incorporazione esclusiva **dell'amminoacido del tipo giusto**

Le macromolecole - proteine

La polimerizzazione, un **amminoacido** alla volta, in una catena lunga è un **procedimento semplice per fabbricare una molecola grande e complessa**, dato che ogni elemento viene ad aggiungersi grazie alla stessa reazione eseguita ripetutamente dalla stessa batteria enzimatica

Le **proteine** vengono sintetizzate impiegando **20 amminoacidi leggermente diversi tra loro**; inoltre nella catena polimerica le subunità non vengono montate a caso, ma in un ordine particolare: **la sequenza amminoacidica**

La funzione biologica delle **proteine** dipende rigidamente dalla specifica **sequenza delle subunità** nella catena lineare. Per questo l'apparato che polimerizza deve sottostare a un **controllo molto fine** e determinare con esattezza la subunità da collocare volta per volta nel polimero in crescita

I componenti chimici di una cellula

Le cellule contengono 4 famiglie principali di piccole molecole organiche:

Il nucleotide

Gruppo fosfato	Zuccheri	Basi	
		Purine	Pyrimidine
<p>β-D-desossiribosio (nel DNA)</p>	<p>Adenina (A)</p>	<p>Timina (T) (nel DNA)</p>
	<p>β-D-ribosio (nell'RNA)</p>	<p>Guanina (G)</p>	<p>Citosina (C)</p>

Nucleotide

BASI

Le basi sono composti ad anello che contengono azoto, o purine o pirimidine

FOSFATI

Sono normalmente uniti al gruppo OH in C5 de ribosio o desossiribosio.

Il fosfato rende un nucleotide carico -

NUCLEOTIDI

Le subunità degli acidi nucleici.

Un nucleotide consiste di una base contenente azoto, uno zucchero a 5 atomi di C e uno o più gruppi fosfato

FOSFATO

ZUCCHERO

LEGAME FRA BASE E ZUCCHERO

ZUCCHERI

PENTOSO

uno zucchero a 5 atomi di C

se ne usano due tipi

Ciascun C numerato dello zucchero di un nucleotide è seguito da un segno primo ('); si parla quindi di "C 5 primo" ecc.

β-D-RIBOSIO
usato nell'acido ribonucleico

β-D-2-DEOSSIRIBOSIO
usato nell'acido deossiribonucleico

NOMENCLATURA

BASE	NUCLEOSIDE	ABBR.
adenina	adenosina	A
guanina	guanosina	G
citosina	citidina	C
uracile	uridina	U
timina	timidina	T

BASE + ZUCCHERO =
NUCLEOSIDE

BASE + ZUCCHERO + FOSFATO =
NUCLEOTIDE

Il legame fosfodiester

Il legame fosfodiesterico

Il complesso enzimatico catalizza l'aggiunta di nucleotidi

all'estremità 3' di una catena di DNA in allungamento, formando

legami fosfodiesterici tra

l'OH legato al C3' dell'ultimo nucleotide già unito alla catena in allungamento e

il gruppo fosfato legato al C5' del nucleotide aggiuntivo

Il legame fosfodiesterico

L'aggiunta dei nucleotidi all'elica nascente richiede ovviamente **energia** che viene **fornita dai nucleotidi stessi**.

Nella reazione di polimerizzazione sono utilizzati **nucleosidi trifosfato** i quali liberano l'energia sufficiente per la formazione del ponte fosfodiesterico in seguito alla rottura del legame ad alta energia esistente tra il **primo P** e gli altri 2

La successiva idrolisi del gruppo Pi-Pi (pirofosfato) rende la reazione irreversibile.

Il legame fosfodiesterico

Le catene di acido nucleico vengono sintetizzate a partire da nucleotidi trifosfato ricchi di **energia**, tramite una reazione di **condensazione** che libera pirofosfato inorganico, mentre si forma il legame fosfodiesterico

Molecole direzionali

Gli acidi nucleici hanno una precisa direzionalità, cioè una polarità strutturale:

- Gli acidi nucleici sono sintetizzati dal 5' al 3'
- la sequenza nucleotidica viene scritta nello stesso ordine

RNA

DNA e RNA

Entrambi sono polimeri lineari di nucleotidi. L'RNA differisce dal DNA in tre modi:

1. contiene ribosio invece di desossiribosio
2. contiene la base uracile (U) al posto della timidina (T)
3. esiste come filamento singolo e non doppio.

OSSATURA DI ZUCCHERI FOSAFATI DELL'RNA

LE QUATTRO BASI DELL'RNA

RNA

SINGOLO FILAMENTO DI RNA

L'RNA è a singolo filamento, ma contiene piccole regioni locali in cui le basi si accoppiano in modo complementare per un processo di ripiegamento casuale. Le regioni in cui le basi sono accoppiate si possono vedere al microscopio elettronico come ramificazioni della catena.

FOTOGRAFIA AL MICROSCOPIO ELETTRONICO DELL'RNA

RNA

Molecola di RNA: una **singola elica** che può assumere una struttura di ordine superiore formando dei tratti a doppio filamento grazie alla formazione di **legami idrogeno intraelica** fra le basi complementari

Distinguiamo diversi tipi di RNA:

1. **rRNA**: sintesi proteica
2. **mRNA**: porta l'informazione
3. **tRNA**: trasporto degli aa sul mRNA
4. **scRNA**: piccoli RNA citoplasmatici: componenti di ribonucleoproteine: es. SRP
5. **snRNA**: splicing
6. **snoRNA**: maturazione dell'rRNA
7. **microRNA (miRNA)**: regolazione dell'espressione genica

Struttura degli acidi nucleici

RNA

Singola catena

DNA

a) Doppia elica

Doppia catena

Struttura del DNA

Il DNA è costituito da **2 catene** (eliche) **polinucleotidiche** che sono fra loro **complementari ed antiparallele**.

Questa doppia elica presenta **2 montanti** **zuccheri-fosfato** con carica negativa

uniti dalle **basi azotate** che si legano con **legami idrogeno** secondo le rigide regole dell'**appaiamento della basi**

a) Doppia elica

GLI ACIDI NUCLEICI - STRUTTURA DEL DNA

OSSATURA DI ZUCCHERI FOSFATI DEL DNA

LE QUATTRO BASI DEL DNA ACCOPPIATE

IL DNA AL MICROSCOPIO ELETTRONICO

La struttura del DNA: appaiamento della basi

I due filamenti di DNA sono tenuti insieme nella doppia elica da **legami H tra le basi** dei 2 filamenti opposti: pertanto tutte le basi (elementi aromatici con scarsa affinità per l'acqua) sono rivolte verso l'interno dell'elica, mentre l'ossatura Z-P rimane all'esterno

A appaia con T e G con C. In entrambi i casi **una purina si appaia con una pirimidina**

In questa disposizione ogni coppia ha lo stesso ingombro e le due ossature Z-P riescono a mantenere tra loro una **distanza costante**

Come conseguenza di queste **rigide regole di appaiamento**, ogni catena di DNA contiene una **sequenza nucleotidica esattamente complementare** alla sequenza nucleotidica della catena cui si lega: questo fatto ha un'importanza fondamentale per la copiatura del DNA

DNA: eliche antiparallele

Le 2 singole eliche sono antiparallele, questo significa che le eliche corrono in direzioni opposte avendo entrambe la stessa polarità:

b) Orientamento antiparallelo dei filamenti e complementarietà delle basi

Struttura del DNA

DNA:

2 catene polinucleotidiche complementari ed antiparallele

sono avvolte nello spazio, intorno ad un'asse virtuale in modo da formare un'elica avvolta in senso destrorso

Diametro dell'elica: 2 nm

Per rispettare la distanza del diametro tra le due eliche complementari se su un'elica è presente una purina su quella complementare ci deve essere una pirimidina.

Non possono affrontarsi 2 purine o due pirimidine quindi il numero delle purine è uguale al numero delle pirimidine.

Coppie canoniche: $\begin{array}{l} \longrightarrow \\ \searrow \end{array}$ T-A (2 legami-H)
G-C (3 legami-H)

a) Doppia elica

GLI ACIDI NUCLEICI - STRUTTURA DEL DNA

LA DOPPIA ELICA DEL DNA

In una molecola di DNA due filamenti antiparalleli con sequenza nucleotidica complementare sono accoppiati in una doppia elica destrorsa con circa 10 nucleotidi per giro.

Modello a spazio pieno del DNA.

fessura principale

fessura secondaria

Acidi nucleici: le basi azotate contengono l'informazione genetica

In una singola catena si identifica uno

scheletro di zuccheri e fosfati

Da questo scheletro

sporgono le **basi azotate**

E' proprio nella sequenza delle basi azotate che è contenuta

l'informazione genetica

ovvero tutte le informazioni necessarie per costruire le proteine che saranno utilizzate per la vita della cellula e dell'intero organismo

Ruolo più importante dei nucleotidi: immagazzinare e rendere disponibile **l'informazione genetica**

La sequenza di un gene e' data dalla sequenza delle 4 basi azotate all'interno della doppia elica

Timina
Timina
Guanina
Citosina
Adenina
Guanina

La struttura del DNA

La scoperta della struttura del DNA avvenne alla Cambridge University nel **1953**, da parte dell'americano **James D. Watson**, ed un inglese, **Francis H. Crick**.

Il loro modello per la struttura del DNA era principalmente basato su studi di diffrazione dei raggi X, ottenuti da da Maurice Wilkins e Rosalind Franklin.

La struttura del DNA

DNA: struttura a spirale. I 2 filamenti avvolgendosi uno sull'altro determinano 2 solchi nell'elica

Basi all'interno: Z-P all'esterno

Il piano delle basi è perpendicolare all'asse dell'elica

Piano dei Z-P: un angolo quasi retto con quello delle basi

Diametro dell'elica: 2 nm

1 nm = 10 Å

Basi adiacenti sono separate da 0,34 nm lungo l'asse dell'elica e formano tra loro un angolo di 36°. La struttura dell'elica si ripete quindi dopo 10 residui di ciascuna catena.

Le proprietà fisiche del DNA

3. Denaturazione e rinaturazione

A 100°C tutti i legami idrogeno si rompono e il DNA diventa singolo a filamento.

DENATURAZIONE

RINATURAZIONE

STATO NATIVO

STATO DENATURATO

STATO RINATURATO

Se il DNA è lasciato a raffreddare lentamente le due emieliche si riappaiano di nuovo correttamente.

Le macromolecole - acidi nucleici

Tra le 4 famiglie principali di piccole molecole organiche contenute nelle cellule, ora trattiamo i **nucleotidi**.

I **nucleotidi** si possono associare in lunghe catene formando gli **acidi nucleici**.

Unendo semplicemente i **nucleotidi** con legami **legami fosfodiesterici** in lunghe catene si formano le macromolecole cellulari: gli **acidi nucleici**

Le reazioni chimiche con cui vengono aggiunti i **nucleotidi** agli **acidi nucleici** presentano importanti caratteristiche comuni alla polimerizzazione delle altre macromolecole (polisaccaridi, proteine).

L'acido nucleico si allunga applicando un nuovo **nucleotide** all'estremità di una catena polimerica in crescita mediante una reazione di condensazione. In tutti i casi la reazione è catalizzata da **enzimi** che garantiscono l'incorporazione esclusiva del **nucleotide** del tipo giusto

Le macromolecole - acidi nucleici

La polimerizzazione, un **nucleotide** alla volta, in una catena lunga è un procedimento semplice per fabbricare una molecola grande e complessa, dato che ogni elemento viene ad aggiungersi grazie alla stessa reazione eseguita ripetutamente dalla stessa batteria enzimatica

Gli **acidi nucleici** vengono sintetizzati impiegando **4 nucleotidi leggermente diversi tra loro**; inoltre nella catena polimerica le subunità non vengono montate a caso, ma in un ordine particolare: **la sequenza nucleotidica**

La funzione biologica degli **acidi nucleici** dipende rigidamente dalla specifica **sequenza** delle subunità nella catena lineare. Per questo l'apparato che polimerizza deve sottostare a un controllo molto fine e determinare con esattezza la subunità da collocare volta per volta nel polimero in crescita

FINE...parte 1

LEZIONE 2 - PARTE 2

Compattamento del DNA:

Cromosomi

Cromatina

Telomeri e centomero

ORGANIZZAZIONE SUPERELICOIDALE DEL DNA: I CROMOSOMI

Discrepanza tra la lunghezza del DNA di una cellula e lo spazio estremamente limitato in cui tale DNA deve essere accolto:

Cellula	Dimensioni del materiale genetico (mm)	Dimensioni della cellula (mm)	Riduzione
Batteriofago T4	0,06	0,00008	ridotto di 750 volte
Escherichia coli	1	0,004	250 volte più lungo della cellula che lo contiene
Nucleo di una cellula aploide umana	3 x 10 ⁹ nucleotidi (in forma completamente distesa: 1,7 metri = 1700 mm)	0,005	350.000 volte superiore al diametro del suo contenitore

ORGANIZZAZIONE SUPERELICOIDALE DEL DNA: I CROMOSOMI

La superspiralizzazione della doppia elica intorno al proprio asse è la soluzione universalmente adottata per concentrare il materiale genetico in un volume relativamente limitato

Le strutture tridimensionali, di diversa grandezza e complessità, generate dalla organizzazione superelicoidale della doppia elica e/o dalla associazione del DNA con proteine che fungono da "rocchetti" di avvolgimento della doppia elica, sono definite

CROMOSOMI

1. Cellule **procariotiche** e **organelli** citoplasmatici delle cellule eucariotiche (mitocondri, cloroplasti) hanno **un singolo cromosoma**
2. Le cellule procariote possono contenere, oltre al cromosoma principale, una o più copie di piccoli cromosomi accessori definiti **plasmidi** che sono implicati nei fenomeni di resistenza agli antibiotici e di sessualità
3. Il patrimonio genetico delle cellule **eucariotiche** è ripartito in un numero definito e costante di cromosomi uguali a due a due, detto **numero cromosomico diploide**

L'organizzazione superelicoidale del DNA: i cromosomi

I cromosomi umani. Il carigramma

L'organizzazione superelicoidale del DNA: i cromosomi

Il DNA dei cromosomi dei virus e dei plasmidi

I **cromosomi virali** hanno una notevole eterogeneità per quanto riguarda forma e dimensioni del DNA. In rapporto alla forma del DNA i cromosomi possono essere distinti in alcune classi principali:

1. Cromosomi **circolari a filamento unico** dove gli estremi 5' e 3' sono saldati covalentemente.

2. Cromosomi **circolari a doppia elica** in cui le estremità 5' e 3' di ciascuno dei due filamenti sono saldate ad anello chiuso.

3. Cromosomi **lineari a filamento unico**

4. Cromosomi **lineari a doppia elica ad estremità tronche**

5. Cromosomi **lineari a doppia elica ad estremità coesive** che possono circularizzare

Il DNA dei **cromosomi batterici** circolari a doppia elica

Il DNA dei **cromosomi mitocondriali e cloroplastici** circolari a doppia elica

Il DNA dei **cromosomi degli eucarioti**
numero definito e costante di cromosomi uguali a due a due,
detto numero cromosomico diploide

Cromatina

Il complesso tra DNA eucariotico e proteine si chiama **cromatina**.

Le proteine principali della cromatina sono gli **istoni**.

1. H1
2. H2A
3. H2B
4. H3
5. H4

Alta % di aminoacidi basici, **Lys e Arg**: facilitano il legame alla molecola di DNA carica negativamente

Legami tra DNA e istoni: idrogeno, ionico, forze di Van der Waals.

Cromatina

Nucleosoma: L'unità strutturale base della cromatina:

2 X H2A

2 X H2B

2 X H3

2 X H4

Su questo ottamero di proteine istoniche si avvolgono 146 pb di DNA (1,75 volte)

Cromatosoma: Nucleosoma + una molecola di istone H1 che tiene bloccati in posizione due giri completi di DNA (166 pb) sul nucleosoma

Cromatina

Il DNA è avvolto intorno agli istoni a formare i nucleosomi e sigillato dall'istone H1. **Proteine non istoniche** si legano al DNA di collegamento fra le particelle del nucleo dei nucleosomi.

Cromatina

La cromatina può poi essere ulteriormente condensata da un avvolgimento in fibre di 30 nm la cui struttura rimane ancora da determinare.

Le fibre di cromatina da 30 nm contengono circa 6 nucleosomi per giro.

Cromatina

Fotografie al microscopio elettronico delle fibre di cromatina da 30 nm e da 10 nm.

L'organizzazione superelicoideale del DNA: i cromosomi

Cromatina

Le interazioni fra le molecole dell'istone H1 sembrano importanti per il compattamento della cromatina a fibra di 30 nm.

H1 si lega a regioni specifiche del nucleosoma

I nucleosomi sono compattati

L'organizzazione superelicoideale del DNA: i cromosomi

Cromatina e cromosomi

Il grado di condensazione della cromatina varia durante il ciclo vitale della cellula. In cellule in interfase:

Eucromatina

- la maggior parte della cromatina (ca. 90%)
- relativamente decondensata e distribuita in tutto il nucleo
- sotto forma di **fibre da 30 nm** organizzate in grandi anse (80%)
 - Circa il 10% della eucromatina, contenente i geni che sono trascritti attivamente, è in uno stato più decondensato che permette la trascrizione: **struttura di 10 nm**

Eterocromatina

- Circa il 10% della cromatina interfaseica
- **stato molto condensato** che assomiglia alla cromatina delle cellule che attraversano la mitosi
- è inattiva dal punto di vista della trascrizione
- contiene sequenze di DNA altamente ripetuto, come quelle presenti in centromeri e telomeri.

FINE...parte 2

Lezione 2 - PARTE 3 - La cellula eucariotica ed i suoi organuli

Vantaggi della compartimentalizzazione:

1. Creazione di un microambiente nel quale enzimi, substrati e cofattori sono **concentrati**: aumenta il numero di interazioni
2. Controllo degli **ambienti chimici**: pH, conc. ioni, ecc
3. **Attività pericolose** sono sequestrate in organuli adeguati

La cellula eucariotica

5-100 μm

Citosol

- **Sostanza semifluida** che occupa metà dello spazio totale interno
- Alcune **attività** cellulari si svolgono nel citosol
- **Contiene** tanti soluti:
 - Ioni inorganici
 - Componenti elementari e precursori delle molecole organiche
 - Carboidrati
 - Lipidi
 - Proteine (alta concentrazione)

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana plasmatica

Struttura: Doppio strato fosfolipidico contenente un gran quantità di proteine, alcuni glucidi e colesterolo

Funzioni:

1. **Delimita** esternamente la cellula separando il compartimento intracellulare ed extracellulare
2. **Mantiene l'omeostasi** cellulare
3. **Regola il trasporto** di sostanze
4. **Controlla il trasferimento di informazioni** tra ambiente extra ed intracellulare
5. **Permette l'interazione fisica** con le altre cellule e le strutture extracellulari circostanti

Membrana plasmatica

Tutte le membrane cellulari: Membrana plasmatica + membrane intracellulari che delimitano i vari compartimenti: RE, Golgi, mitocondri, nucleo

Hanno in comune: struttura e alcune funzioni

Differenze: fini differenze strutturali soprattutto in riferimento alla componente proteica, che conferisce ad ogni organulo prerogative funzionali

MEMBRANA PLASMATICA

- molecole lipidiche disposte in 2 strati vicini e giustapposti, il **doppio strato lipidico**: struttura base
- Le **proteine** mediano quasi tutte le altre funzioni e conferiscono le caratteristiche individuali a ogni tipo di membrana

Membrana citoplasmatica

Doppio strato fosfolipidico in cui le **proteine** sono incluse come unità globulari individuali e discrete

Lipidi di membrana:

1. Fosfolipidi
2. Sfingolipidi: Sf-lpd che contengono P
Sf-lpd che non contengono P
3. Steroidi

Le **proteine di membrana** assicurano la specificità funzionale delle membrane:

1. Proteine integrali o intrinseche
2. Proteine periferiche o estrinseche
3. Proteine ancorate ai lipidi

Carboidrati di membrana

Fosfolipidi

Steroidi

Il principale componente di natura steroidea della membrana è il **colesterolo**

Piccola porzione polare

un gruppo OH ad un'estremità della molecola

Regione apolare
4 anelli idrocarburici più una catena laterale

Molecola meno anfipatica dei fosfolipidi

Il colesterolo si trova completamente immerso nel doppio strato

a)

L'OH si posiziona nei pressi della testa polare dei fosfolipidi con la quale stabilisce dei legami -H

porzione **polare** del colesterolo è rivolta verso le superfici esterna ed interna della cellula

b)

porzione **apolare** si dispone parallelamente alle code degli acidi grassi

interagisce con le code idrocarburiche dei fosfolipidi adiacenti

Effetti della presenza di colesterolo:

interferisce con l'eccessivo compattamento delle code di acidi grassi dei fosfolipidi, consentendo alle membrane di mantenere una certa **fluidità**.

La cellula eucariotica animale - MEMBRANA PLASMATICA

MODELLO A MOSAICO FLUIDO

I lipidi di membrana possono spostarsi e scambiarsi di posto tra loro nell'ambito del doppio strato

diffusione laterale

flessione rotazione

Consente:

Diffusione proteine e lipidi (per segnalazione o dopo la sintesi)

Fusione di membrane tra loro

Miscelazione molecole x equa distribuzione

Membrana citoplasmatica

Doppio strato fosfolipidico in cui le proteine sono incluse come unità globulari individuali e discrete

Lipidi di membrana:

1. Fosfolipidi

2. Sfingolipidi:

Sf-lpd che contengono P

Sf-lpd che non contengono P

3. Steroidi

Le proteine di membrana assicurano la specificità funzionale delle membrane:

1. Proteine integrali o intrinseche

2. Proteine periferiche o estrinseche

3. Proteine ancorate ai lipidi

Carboidrati di membrana

Proteine integrali o intrinseche

Presentano una o più regioni immerse e strettamente associate con il doppio strato fosfolipidico

Aa **idrofobici**:
interagiscono con gli acidi grassi dei fosfolipidi ancorando la pt alla membrana stessa
Poche sono localizzate solo su un versante

La maggior parte sono **transmembrana**: attraversano completamente il doppio strato ed hanno **domini idrofilici** che si estendono sia su un versante che sull'altro

Carboidrati di membrana: catene oligosaccaridiche ramificate o lineari (2-60 residui)

La **superficie esterna** della membrana è caratterizzata dalla presenza di gruppi glucidici

Questi carboidrati si **legano sia alle proteine che ai lipidi** della superficie esterna della membrana

Membrane cellulari interne hanno catene oligosaccaridiche esposte sul **versante opposto a quello citoplasmatico**

MEMBRANA PLASMATICA: il GLICOCALICE (strato a glucidi)

- **Glicoproteine**: glucidi legati con legami covalenti a proteine

- **Glicolipidi**: glucidi legati con legami covalenti a lipidi

Glicoproteine e glicolipidi sono talmente abbondanti sulla **superficie esterna** della membrana che la cellula risulta ricoperta da una sorta di rivestimento glucidico, detto **GLICOCALICE**

Funzioni dei glicolipidi e delle glicoproteine che costituiscono il glicocalice:

1. funzione meccanica (protezione della superficie cellulare)
2. riconoscimento recettore- ligando
3. interazione cellula-cellula
4. ruolo antigenico
5. siti di riconoscimento e legame per diversi virus e batteri
6. Assorbendo acqua rende la superficie scivolosa (es. leucociti)

IL TRASPORTO DI MEMBRANA

IL TRASPORTO DI MEMBRANA

Le cellule vivono e crescono scambiando molecole con il loro ambiente e la membrana plasmatica agisce da barriera, controllando il transito delle molecole che entrano ed escono dalla cellula

PROTEINE DI TRASPORTO DI MEMBRANA molecola trasportata

1

2

3

IL TRASPORTO DI MEMBRANA

MOLECOLE IDROFOBICHE

O₂
CO₂
N₂
benzene

diffusione semplice

1

PICCOLE MOLECOLE POLARI PRIVE DI CARICA

H₂O
urea
glicerolo

permeabile

Non è coinvolta nessuna proteine di membrana

Il flusso netto di molecole è sempre a favore di gradiente: da un compartimento ad alta concentrazione

↓

a uno a bassa concentrazione

GROSSE MOLECOLE POLARI PRIVE DI CARICA

glucosio
saccarosio

non permeabile

IONI

H⁺, Na⁺
HCO₃⁻, K⁺
Ca²⁺, Cl⁻
Mg²⁺

doppio strato lipidico

Durante la diffusione semplice una molecola si dissolve nel doppio strato fosfolipidico, diffonde attraverso di esso e si riversa nella soluzione acquosa dall'altro lato della membrana.

PROTEINE DI TRASPORTO DI MEMBRANA

1

2

3

PROTEINE DI TRASPORTO DI MEMBRANA

1

2

3

IL TRASPORTO DI MEMBRANA: DIFFUSIONE FACILITATA

Movimento dal compartimento a più alta concentrazione a quello a più bassa concentrazione, quindi **secondo gradiente** di concentrazione o di potenziale elettrico

Il passaggio delle molecole è **mediato da proteine** che permettono alle molecole trasportate di attraversare la membrana senza interagire direttamente con il suo interno idrofobico

Proteine vettore: dotate di parti mobili, traghettano piccole molecole da un lato all'altro della membrana cambiando forma. Trasportano piccole molecole organiche e ioni inorganici. Es. glucosio verso l'interno della cellula

PROTEINE DI TRASPORTO DI MEMBRANA

1

2

3

IL TRASPORTO DI MEMBRANA: DIFFUSIONE FACILITATA

Proteine canale: formano minuscoli pori idrofilici nella membrana, che i soluti attraversano per diffusione.

Canali ionici: mediano il passaggio di ioni attraverso la membrana plasmatica

Importanti nelle cellule nervose e muscolari

3 proprietà fondamentali:

1. Trasporto rapido, maggiore rispetto al trasporto mediato da proteine trasportatrici
2. Selettivi: limitano il passaggio di Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Cl^-
3. Non sono sempre aperti: l'apertura è regolata in risposta a stimoli specifici (ligandi o voltaggio)

Il flusso di ioni attraverso i canali di membrana dipende dall'esistenza di **gradienti ionici** attraverso la membrana plasmatica.

PROTEINE DI TRASPORTO DI MEMBRANA

1

2

3

3

TRASPORTO ATTIVO

IL TRASPORTO DI MEMBRANA

POMPA ATPasi Na⁺-K⁺

SPAZIO EXTRACELLULARE

1

2

3

4

5

6

CITOSOL

esterno

sito di legame
per Na⁺

ATP

ADP + F

K⁺

Pompa Na⁺/K⁺

Canale
del K⁺

interno

Lezione 5 - La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana nucleare

Pori nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato del Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo endoplasmatico liscio

Reticolo endoplasmatico rugoso

Membrana citoplasmatica

I RIBOSOMI

Complessi fortemente interconnessi di proteine ed RNA. Denominati secondo la loro velocità di sedimentazione: 70S batterici; 80S eucariotici

RIBOSOMA
PROCARIOTICO

RIBOSOMA
EUCARIOTICO

I RIBOSOMI

Le dimensioni dei ribosomi vengono espresse in base al loro **Coefficiente di sedimentazione** espresso in unità **Svedberg (S)**: unità che misura la densità di un organulo cellulare o di una macromolecola verificando il punto in cui sedimenta mediante ultracentrifugazione in gradiente di densità

I RIBOSOMI

Complessi fortemente interconnessi di proteine ed RNA. Denominati secondo la loro velocità di sedimentazione: 70S batterici; 80S eucariotici

RIBOSOMA PROCARIOTICO

RIBOSOMA EUCARIOTICO

catalizzano legami peptidici

subunità

rRNA

strutture secondarie

proteine

I RIBOSOMI

I ribosomi sono gli organuli che provvedono alla sintesi proteica. Nelle cellule eucariotiche possono essere:

liberi nel citoplasma

Producono Proteine:
-che sono utilizzate nel citosol

legati al reticolo endoplasmatico

Producono Proteine:
-destinate ad essere inserite nelle membrane, o
-destinate ad essere esportate dalla cellula (secrete)

Ribosomi liberi e legati sono identici e possono alternarsi

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana
nucleare

Pori
nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato
del
Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo
endoplasmatico
liscio

Reticolo
endoplasmatico
rugoso

Membrana
citoplasmatica

RETICOLO ENDOPLASMATICO RUGOSO

Struttura:

Canalicoli e cisterne ampie ed appiattite, interconnessi tra loro e ricoperti sulla superficie citoplasmatica da **ribosomi**

RETICOLO ENDOPLASMATICO RUGOSO

Funzione:

Sintesi di proteine :

1. destinate ad essere esportate al Golgi, ai Lisosomi, alle vescicole di accumulo
2. destinate ad essere secrete
3. proteine di membrana

Dopo la sintesi le proteine sono rilasciate nel lume del RE e subiscono **rimaneggiamenti e ripiegamenti specifici**

RETICOLO ENDOPLASMATICO RUGOSO: RIBOSOMI LIBERI E LEGATI A MEMBRANA

L'mRNA che codifica una proteina citosolica rimane libero nel citosol

poliribosoma libero nel citosol

pool comune di subunità ribosomali nel citosol

l'RNAm che codifica una proteina indirizzata al RE rimane legato alla membrana

poliribosoma legato alla membrana del RE mediante catene nascenti multiple

peptide segnale del RE

membrana del RE

- I Ribosomi sono tutti identici: differiscono solo per le proteine che sintetizzano
- Il Ribosoma che sintetizza una proteina con una sequenza segnale va all'RE
- Il poliribosoma rimane attaccato alla membrana e alla fine si libera

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana
nucleare
Ribosomi

Pori
nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Citoscheletro

Apparato
del
Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo
endoplasmatico
liscio

Reticolo
endoplasmatico
rugoso

Membrana
citoplasmatica

RETICOLO ENDOPLASMATICO

Lo strato esterno della membrana nucleare prosegue nella membrana del **RETICOLO ENDOPLASMATICO (RE)**, sistema ininterrotto di **concamerazioni e tubuli membranosi**, che spesso si estende a tutta la cellula e si divide in RER e REL:

RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO

Struttura:

L'RE liscio è scarso nella maggioranza delle cellule, ma è molto sviluppato in alcune cellule che hanno particolari funzioni: es. cell delle ghiandole surrenali ed epatociti

Sistema ininterrotto di **concamerazioni e tubuli membranosi** privi di ribosomi

Nelle sue membrane sono inclusi diversi enzimi deputati ad eseguire le funzioni di questo organulo.

RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO

Funzioni:

1. **Sintesi di molecole lipidiche:** colesterolo, steroidi, trigliceridi e fosfolipidi che faranno parte di tutte le membrane cellulari, comprese quelle dello stesso reticolo
2. Sintesi di **glicolipidi, carboidrati**
3. **Trasporto** di proteine, glicoproteine e lipoproteine
4. Sede in cui avviene l' **idrolisi del glicogeno**
5. Sede in cui avviene la **detossificazione** di scorie metaboliche, sostanze nocive, farmaci (anfetamine, morfina, barbiturici, tossine, pesticidi, erbicidi).

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana
nucleare

Pori
nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato
del
Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo
endoplasmatico
liscio

Reticolo
endoplasmatico
rugoso

Membrana
citoplasmatica

APPARATO DI GOLGI

Struttura:

Compartimenti e sacculi membranosi appiattiti (3-8), ordinati a formare una pila leggermente ricurva.

Nella regione perinucleare, circondato da vescicole e tubuli

Struttura dinamica caratterizzata da un turnover costante che è direttamente correlato all'ampio flusso di pt e lipidi provenienti dal RE

Ha due lati: cis e trans

Il materiale viene trasportato da vescicole di transizione dal RE

alle cisterne cis

alle cisterne mediane

alle cisterne trans

Le cisterne sulle 2 facce si differenziano per forma, dimensioni, enzimi e contenuto delle vescicole associate

APPARATO DI GOLGI

APPARATO DI GOLGI

Funzioni:

1. Immagazzina, impacchetta e distribuisce molecole già sintetizzate in diverse regioni della cellula

2. Apporta **modifiche** alle molecole che passano nelle sue cisterne:

1. modificazione di **aa**
2. **Glicosilazione**: aggiunta di zuccheri per formare glicoproteine e glicolipidi
3. Modifica di glicoproteine e glicolipidi sintetizzati altrove:

1. Solvatazione
2. Acetilazione
3. Deaminazione

3. **Rimaneggiamento dei lipidi**: glicolipidi e sfingomieline

4. **Sintesi di polisaccaridi** complessi

Le diverse cisterne hanno **diversi enzimi** che agiscono sulle molecole che mano a mano raggiungono le diverse cisterne, in maniera precisa secondo una sequenza determinata

RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO

Funzioni:

1. **Sintesi dei lipidi:** per le membrane cellulari
2. **Sintesi di glicolipidi, carboidrati**
3. **Trasporto** di proteine, glicoproteine e lipoproteine
4. **Idrolisi del glicogeno**
5. **Detossificazione**

APPARATO DI GOLGI

Funzioni:

1. **Immagazzina, impacchetta e distribuisce** molecole già sintetizzate altrove
2. **Modifica le molecole** che passano nelle sue cisterne:
 - aminoacidi modificazione;
 - Glicosilazione per formare glicoproteine e glicolipidi;
 - solvatazione acetilazione e deaminazione di glicoproteine e glicolipidi sintetizzati altrove
3. **Rimaneggiamento dei lipidi:** glicolipidi e sfingomieline
4. **Sintesi di polisaccaridi complessi**

APPARATO DI GOLGI

Le molecole nuove vengono raccolte in **vescicole di trasporto** che si originano per gemmazione e si fondono alle cisterne successive o si avviano verso la membrana plasmatica

1. molecole dirette verso la **membrana plasmatica**, perché destinate a farne parte o perché seguono la via della **secrezione**
2. molecole destinate ad **altri compartimenti cellulari**
3. proteine trattenute nel **Golgi** perché residenti funzionalmente in esso

I meccanismi di smistamento sono numerosi perché numerose sono le **destinazioni** indicate da segnali molecolari

TRAFFICO VESCICOLARE NELLE VIE SECRETORIE ED ENDOCITICHE

VIA SECRETORIA
VIA ENDOCITICA
VIA DI RECUPERO

Le vescicole **gemmano** da una membrana e vanno a **fondersi** con un'altra, **trasportando** componenti della membrana e proteine solubili da un comparto cellulare all'altro. Ogni comparto racchiude un volume interno o lume, **topologicamente equivalente** all'esterno della cellula. Lo spazio extracellulare e ciascuno dei compartimenti delimitati da membrana comunicano tra loro per mezzo di vescicole di trasporto.

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana
nucleare

Pori
nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato
del
Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo
endoplasmatico
liscio

Reticolo
endoplasmatico
rugoso

Membrana
citoplasmatica

TRAFFICO VESICOLARE NELLE VIE SECRETORIE ED ENDOCITICHE DAL GOLGI AI LISOSOMI

I lisosomi sono sacchetti di **enzimi digestivi**, che degradano gli organelli troppo consumati e anche le macromolecole e le particelle che la cellula assume per endocitosi.

Contengono una quarantina di **enzimi idrolitici** di diverso tipo, tra cui quelli che degradano le proteine, gli acidi nucleici, gli oligosaccaridi e i fosfolipidi

ph acido mantenuto dentro ai lisosomi da una **pompa per H⁺** alimentata ad ATP che trasloca protoni nel lume e ne mantiene il contenuto a ph acido

Le proteine della membrana lisosomica sono fortemente **glicosilate** per proteggerle dall'autodigestione proteasica

IL TRASPORTO DALLA MEMBRANA PLASMATICA TRAMITE GLI ENDOSOMI:

ENDOCITOSI

Endocitosi mediata da recettori:
colesterolo, vitamina B12, ferro

La molecola da internalizzare si lega a **recettori** situati sulla superficie cellulare e i **complessi recettore ligando** vengono internalizzati per endocitosi e recapitati agli **endosomi**. Quando il recettore rilascia il ligando, ritorna alla membrana plasmatica via vescicole di trasporto e viene **riutilizzato**. Il ligando viene invece riversato nei lisosomi dove viene digerito.

IL TRASPORTO ALLA MEMBRANA PLASMATICA TRAMITE GLI ENDOSOMI:

ESOCITOSI

La cellula secerne continuamente tramite **esocitosi costitutiva**, operante in tutte le cellule: proteine solubili, proteine e lipidi di nuova sintesi per la membrana plasmatica.

Le cellule specializzate nella secrezione possiedono anche una via di **esocitosi regolata**: le proteine con questo destino, dal Golgi trans vengono deviate in **vescicole secretorie**: lì le proteine **si concentrano e si accumulano** finchè non arriva un segnale extracellulare a **indurre** la loro secrezione.

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana nucleare

Pori nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato del Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo endoplasmatico liscio

Reticolo endoplasmatico rugoso

Membrana citoplasmatica

PEROSSISOMI

Contengono **enzimi ossidativi** come le

1. **urato ossidasi** che catalizzano le **ossidazioni** di substrati quali **acido urico, acil-CoA** ecc. partendo da ossigeno molecolare e **producendo acqua ossigenata**
2. **catalasi** che **decompongono l'acqua ossigenata** (che è tossica per le cellule) in ossigeno e acqua.

Nel complesso questi enzimi intervengono nella **degradazione delle purine** e nella **beta-ossidazione degli acidi grassi** con la produzione di acetil-CoA.

200 nm

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana nucleare

Pori nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato del Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo endoplasmatico liscio

Reticolo endoplasmatico rugoso

Membrana citoplasmatica

I MITOCONDRI

Sono organelli circondati da membrane che convertono l'energia in forme utili a promuovere le reazioni cellulari

FUNZIONE DEI MITOCONDRI

Carboidrati, **aminoacidi** e **acidi grassi** introdotti come alimento dentro le cellule vengono assorbiti dai mitocondri che li ossidano fino ad CO_2 e H_2O , e utilizzano l'energia ricavata per convertire adenosin-difosfato (ADP) in adenosin-trifosfato (**ATP**)

I MITOCONDRI

La Matrice contiene:

1. Enzimi
 1. per l'ossidazione del piruvato e degli acidi grassi
 2. per il ciclo dell'acido citrico
2. molte copie identiche del DNA del genoma mitocondriale
3. speciali ribosomi mitocondriali
4. tRNA
5. enzimi necessari per l'espressione dei geni mitocondriali.

Ciclo dell'acido citrico o ciclo di Krebs

I MITOCONDRI

Membrana interna: E' ripiegata in numerose **creste** che aumentano di molto la sua superficie totale. Essa contiene proteine con 3 funzioni:

1. pt che svolgono le reazioni di ossidazione della catena respiratoria
2. un complesso enzimatico chiamato *ATP sintasi* che produce ATP nella matrice
3. Pt di trasporto che regolano il passaggio di metaboliti dentro e fuori della matrice

Ossidazione della catena respiratoria

I MITOCONDRI

Membrana esterna contiene diversi tipi di proteine:

1. **porina**, grossa proteina che forma un canale permeabile a tutte le molecole inferiori ai 5000 dalton
2. enzimi coinvolti nella **sintesi mitocondriale dei lipidi**
3. enzimi che **convertono substrati lipidici** in forme che sono successivamente metabolizzate nella matrice.

Spazio intermembrana: Contiene parecchi enzimi che usano l'ATP che esce dalla matrice per **fosforilare altri nucleotidi**

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana
nucleare

Pori
nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato
del
Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo
endoplasmatico
liscio

Reticolo
endoplasmatico
rugoso

Membrana
citoplasmatica

→ **Filamenti di actina**

→ **Microtubuli**

→ **Filamenti intermedi**

Filamenti di actina o microfilamenti:

- polimeri elicoidali a due filamenti della pt **actina**
- strutture flessibili, con un diametro di **5-9 nm** organizzate in una varietà di **fasci** lineari, **reti** bidimensionali e **gel** tridimensionali
- dispersi in tutta la cellula ma più concentrati nella **corteccia**, appena sotto la membrana plasmatica.

25 nm

25 nm

25 nm

25 nm

25 nm

25 nm

Microtubuli

Filamenti intermedi

Filamenti di actina o microfilamenti

Microtubuli:

- lunghi cilindri cavi composti dalla pt tubulina

- diametro esterno di 25 nm sono molto più rigidi dei filamenti di actina e sono lunghi e diritti

- hanno una estremità attaccata ad un singolo centro organizzatore dei microtubuli (MTOC): centrosoma.

Filamenti intermedi

Filamenti di actina o microfilamenti

Microtubuli

Filamenti intermedi:

- fibre a forma di corda con un diametro di circa **10 nm**
- costituiti da **proteine** dei filamenti intermedi, che costituiscono una **famiglia grande e eterogenea**
- Un tipo di filamento intermedio forma un reticolo, chiamato **lamina nucleare**, proprio sotto la membrana nucleare interna
- Altri tipi si estendono attraverso il citoplasma, dando alle cellule **forza meccanica** e sopportando gli stress meccanici nel tessuto epiteliale, attraversando il citoplasma da una giunzione cellulare all'altra.

La cellula eucariotica

5-100 μm

Membrana nucleare

Pori nucleari

Nucleo

Nucleolo

Mitocondri

Ribosomi

Citoscheletro

Apparato del Golgi

Lisosomi

Centrioli

Perossisomi

Reticolo endoplasmatico liscio

Reticolo endoplasmatico rugoso

Membrana citoplasmatica

Nucleo cellulare

- Componente essenziale della cellula
- Struttura assente nei procarioti
- Contiene il **materiale genetico** (DNA)
- Sede di meccanismi indispensabili alla **riproduzione cellulare** e alla **sintesi proteica**

Nucleo cellulare

Il nucleo svolge un ruolo cruciale nel **controllo** della vita della cellula e nel processo di **divisione** cellulare

Entrambe le funzioni dipendono strettamente dall'**acido desossiribonucleico** (DNA) contenuto nel nucleo

IL NUCLEO CELLULARE

Il nucleo costituisce la **sede dell'informazione genetica**, visto che in esso risiedono le molecole di DNA e che sempre al suo interno, queste sono duplicate e trascritte.

Nucleo: **controllore e coordinatore** delle attività della cellula

IL NUCLEO CELLULARE

Nel nucleo molecole lunghissime di DNA sono associate a proteine a formare la **cromatina**

Nucleo contiene un **pool vario di molecole**: pt, tra cui enzimi, RNA e altre componenti coinvolte in duplicazione, sintesi e processamento RNA

Continuo passaggio di molecole dal citoplasma al nucleo e viceversa in modo controllato

IL NUCLEO CELLULARE: Involucro nucleare o carioteca

È una **doppia membrana**:

membrana nucleare **interna** e
membrana nucleare **esterna**

} entrambe costituite da un doppio strato fosfolipidico

Non sono strettamente aderenti una all'altra ma sono separate da uno **spazio perinucleare**

La membrana esterna è **continua con il RE** e spesso presenta aderenti alla superficie citoplasmatica dei **ribosomi**

IL NUCLEO CELLULARE: Il poro nucleare

L'involucro nucleare non è un limite continuo perchè **le 2 membrane si fondono** in alcuni punti determinando uno spazio libero che assume la forma di **canale** e che viene indicato come poro nucleare

La superficie dell'involucro nucleare risulta costellata di tali interruzioni

IL NUCLEO CELLULARE: Lamina nucleare

Struttura:

Sottile e densa rete di proteine adesa al **versante nucleoplasmatico** della membrana interna dell'involucro nucleare

Formata dai filamenti omologhi ai **filamenti intermedi del citoscheletro**

Funzioni:

1. sostegno
2. ancoraggio per i cromosomi nella mitosi

IL NUCLEO CELLULARE: Nucleolo

Struttura specializzata comprendente:

1. un gruppo di **geni** che portano l'informazione per gli rRNA
2. i corrispondenti **trascritti di RNA**
3. molte **proteine**

Non circondati da membrana, ma con **contorni** sufficientemente definiti

Contiene particelle ribosomali a vari stadi di assemblaggio

Biogenesi dei ribosomi nel nucleolo:

pt ribosomali prodotte nel citoplasma si associano agli rRNA neosintetizzati

dopo il loro assemblaggio le unità ribosomali vengono esportate nel citoplasma attraverso i pori nucleari

I RIBOSOMI

Complessi fortemente interconnessi di proteine ed RNA. Denominati secondo la loro velocità di sedimentazione: 70S batterici; 80S eucariotici

RIBOSOMA PROCARIOTICO

RIBOSOMA EUCARIOTICO

catalizzano legami peptidici

Ripieg rRNA e posiz tRNA

subunità

rRNA

strutture secondarie

proteine

fine

Identificazione del DNA come materiale genetico

Nonostante il **DNA** fosse noto sin dal 1868, la sua identificazione come **materiale genetico** è avvenuta solo nel 1944 ed è intimamente legata agli studi sulla virulenza del microrganismo, il *Diplococcus pneumoniae*, o più semplicemente pneumococco, che causa la polmonite nei mammiferi. I pneumococchi possono esistere in 2 varietà:

- 1) **S: virulenta**, provvista di una capsula polisaccaridica di rivestimento che ne impedisce la fagocitosi;
- 2) **R: non virulenta**, sprovvista di capsula.

1. Esperimento di Griffith, 1928 (1 DIA)

2. Esperimento di O. Avery, C. MacLeod, M. McCarty, 1944 (2 DIA)

3. Esperimento di Hershey e Chase, 1953 (3 DIA)

Identificazione del DNA come materiale genetico: Esperimento di Griffith, 1928

Iniezione del ceppo virulento S

Topo muore

Iniezione del ceppo non virulento R

Topo vive

Iniezione del ceppo virulento S ucciso

Topo vive

Iniezione del ceppo non virulento R + ceppo virulento S ucciso

Topo muore

Quando una sostanza presente nell'estratto S (chiamata principio trasformante)

era responsabile per l'induzione della trasformazione genetica dei batteri R in S.

Identificazione del DNA come materiale genetico

Esperimento di O. Avery, C. MacLeod, M. McCarty, 1944

Stabilirono che il principio trasformante era il DNA, purificandolo da estratti batterici

Il DNA della specie patogena veniva assunto dalla specie innocua e trasmesso fedelmente alle generazioni batteriche successive

Identificazione del DNA come materiale genetico

Esperimento di O. Avery, C. MacLeod, M. McCarty, 1944

Identificazione del DNA come materiale genetico

Esperimento di Hershey e Chase

Alfred Harshey e Martha Chase stavano studiando nel 1953 un batteriofago chiamato T2.

Fotografia al M.E. del batteriofago T2

Identificazione del DNA come materiale genetico: Esperimento di Hershey e Chase

Hershey e Chase sapevano che il virus T2 era costituito soltanto da DNA e proteine e che il virus era in qualche modo capace di usare il proprio materiale genetico per riprogrammare la cellula ospite per farle produrre nuovi fagi. Tuttavia, non erano a conoscenza di quale dei due componenti, DNA o proteine, fosse la causa.

Identificazione del DNA come materiale genetico

Esperimento di Hershey e Chase