PET con ^{18}F -FDG

Il radiofarmaco di metabolismo per "eccellenza": il ^{18}F -FDG

- E' un **analogo** "strutturale" del **glucosio**.
- Entra nella cellula e viene fosforilato dall'enzima "**esochinasi**" a FDG6-P, con consumo di **ATP**.
- Non può però proseguire nella via glicolitica e resta, pertanto, **intrappolato** all'interno delle cellule, dove si accumula.

La PET con ^{18}F -FDG

- Numerosi studi hanno dimostrato che il tessuto neoplastico in rapida crescita **utilizza** prevalentemente il **glucosio** come **substrato** a fini energetici.
- L'utilizzo della PET con **traccianti specifici** per la misura del **metabolismo cellulare** tumorale permette di valutare il grado di aggressività del tumore, la presenza e distribuzione delle metastasi a distanza, l'effetto di trattamenti chemio e/o radioterapici sulla vitalità del tumore e la diagnosi differenziale tra recidiva tumorale e necrosi da terapia radiante.
- In questo modo è possibile ottenere informazioni che limitano il numero di procedure diagnostiche invasive.

Metabolismo del ^{18}F -FDG

Preparazione del paziente:

- *controllo della glicemia;*
- *blanda idratazione (500ml per os);*
- *posizionamento agocannula (abbocath);*
- *somministrazione di 4-6MBq/Kg di ^{18}F -FDG e.v.;*
- *50'-60' di attesa in completo relax.*

- Il **total-body PET**, che viene tradizionalmente acquisito dalla base del cranio alla radice degli arti inferiori, fornisce informazioni **tridimensionali** sulle **sedi** e sulla **entità di fissazione** del radiofarmaco somministrato (generalmente **^{18}F -FDG**) e, quindi, del **metabolismo glucidico** di determinati apparati, organi o strutture.

Il "SUV"

- Acronimo di *Standardized Uptake Value* (valore di captazione standardizzato).
- E' un *parametro quantitativo* che correla con la "avidità" da parte di un certo tessuto a fissare il ^{18}F -FDG.
- Si ricava conoscendo la concentrazione tissutale del tracciante (c_t) ricavabile dalle immagini PET, la dose iniettata ed il peso (weight) del soggetto in esame.

$$SUV_{TBW} = \frac{c_t [kBq/ml]}{Dose[MBq]/weight[kg]}$$

FDG-PET in Criteri per un uso

Tavole riassuntive

Tavola 1. Elenco riassuntivo grado di appropriatezza

Categoria "Appropriato"

PATOLOGIA	SCENARIO CLINICO
Nodulo polmonare	• soggetti con noduli a 1 cm
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	• stadiazione nei pazienti • definizione del piano • caratterizzazione di
Colon retto	• ristadiazione in pazienti di esami di laboratorio morfologico dubbio • stadiazione in pazienti operabili
Testa collo	• valutazione della morfologia • definizione del piano
Ricerca del carcinoma occulto in pazienti con metastasi documentata	• ricerca del tumore
Hodgkin e non Hodgkin (linfomi aggressivi: diffuso a grandi cellule B e mantellare)	• stadiazione nella malattia • valutazione precoce del trattamento se valutazione della risposta • stadiazione in pazienti di malattia
Melanoma	• pazienti con lesioni
Esofago	• stadiazione nei pazienti operabili
Ovaio	• stadiazione in pazienti di esami di laboratorio da reperti di imaging
Tiroide	• identificazione dell'ipertiroidismo e 1131I
Tumori delle cellule germinali	• valutazione della risposta

Dossier 11
13

FDG-PET in oncologia. Criteri per un uso appropriato

Categoria "Potenzialmente utile"

PATOLOGIA	SCENARIO CLINICO
Carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC)	• stadiazione pre-trattamento • valutazione al termine del trattamento
Mammella	• stadiazione nei tumori operabili • stadiazione in pazienti di esami di laboratorio morfologico dubbio
Colon retto	• stadiazione pre-operativa
Testa collo	• stadiazione
Melanoma	• pazienti affetti da metastasi
Esofago	• ristadiazione in pazienti operabili
Cervice uterina	• definizione del piano localmente avanzato • ristadiazione in pazienti di chirurgia e/o radioterapia
Pancreas	• differenziazione tra stadiazione in pazienti di esami di laboratorio morfologico dubbio
Osteo-sarcoma, sarcoma di Ewing	• valutazione basale
Gist	• valutazione basale
Tumori delle cellule germinali	• valutazione della risposta basale effettuata
Stomaco	• stadiazione in pazienti operabili • ristadiazione in pazienti di ripresa di malattia

Dossier 11
14

FDG-PET in oncologia. Criteri per un uso appropriato

Categoria "Di utilità tuttora non documentata"

PATOLOGIA	SCENARIO CLINICO
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	• valutazione della risposta al trattamento nei pazienti operabili
Colon retto	• stadiazione pre-operativa
Hodgkin e non Hodgkin (linfomi aggressivi: diffuso a grandi cellule B e mantellare)	• follow up
Linfomi a basso grado follicolari	• valutazione basale al termine della terapia • stadiazione in pazienti di malattia
Tiroide	• identificazione di recidive sospette di malattia I 131I alla scintigrafia

Categoria "Appropriatezza indeterminata"

PATOLOGIA	SCENARIO CLINICO
Mammella	• valutazione della risposta

Dossier 11
15

FDG-PET in oncologia. Criteri per un uso appropriato

Categoria "Inappropriato"

PATOLOGIA	SCENARIO CLINICO
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	• stadiazione del carcinoma bronchiolo alveolare
Hodgkin e non Hodgkin (linfomi aggressivi: diffuso a grandi cellule B e mantellare)	• valutazione precoce risposta alla terapia (dopo 1-2 cicli di trattamento) se valutazione basale NON effettuata
Linfomi a basso grado non follicolari	• stadiazione • valutazione della risposta al trattamento al termine della terapia
Ovaio	• stadiazione • follow up nei pazienti asintomatici (e con indici laboratoristici nella norma)
Gist	• valutazione della risposta alla terapia se valutazione basale NON effettuata
Neoplasie cerebrali	• differenziazione tra recidiva e radionecrosi post-radioterapica • nei pazienti con glioma per lo studio del grading
Stomaco	• follow up
Carcinoide	• stadiazione • follow up
Prostata	• stadiazione • pazienti già trattati con elevati livelli di PSA in assenza di evidenza clinica di ripresa di malattia • valutazione dei pazienti con singola lesione potenzialmente trattabile con intenti di radicalità
Rene	• stadiazione • studio delle recidive potenzialmente operabili • follow up
Tumori neuroendocrini	• stadiazione • valutazione della risposta al trattamento al termine della terapia

Dossier 117
16

Indicazioni in ambito oncologico

- *Diagnosi di natura* di formazioni espansive riscontrate con altre metodiche (es. nodulo solitario del polmone).
- *Stadiazione* in pazienti con lesioni primitive note.
- Diagnosi differenziale tra *recidiva* ed *esiti* post-trattamento radioterapico.
- Valutazione della *risposta al trattamento* chemio e/o radioterapico ("ad interim" e/o "end treatment").
- *Ricerca di malattia* in pazienti oncologici con aumento dei *marcatori tumorali* e quadro clinico-strumentale negativo o dubbio.
- *Ricerca di malattia* in pazienti con *metastasi* da primitivo a sede ignota.

PET total body con ^{18}F -FDG (reperto normale)

PET total body con ^{18}F -FDG (adenocarcinoma polmonare)

PET total body con ^{18}F -FDG (adenocarcinoma polmonare - immagini di fusione)