Alterazioni coagulazione

Fibrina → Trombi → trombosi microcircolo → alterazione perfusione tissutale, ipotensione, ipossia, danno tissutale, MODS

ESAURIMENTO RISPOSTA IMMUNE

NO, PGL, Trombossano A2, leucotrieni, istamina, bradichinina
SEPSI - SHOCK SETTICO

Clinical Review State of the Art
Sepsis: pathophysiology and clinical management
BMJ 2016; 353 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.j1585>

Inflammatory Mechanisms

Pathogen / Danger Associated Molecular Patterns (PAMPs / DAMPs)

- PAMPs: componenti unici dei microrganismi (non prodotte dall'ospite) spesso essenziali per il patogeno. es. LPS, acido lipoteicoico, GPI, CpG, RNA a doppia elica, flagellina.
- DAMPs: sono prodotte nel ospite durante l'inflammatione o possono provenire dal esterno. es. heat-shock proteins, RNA da cellule morte, proteina BA, Mrp8/14, fosfolipidi ossidati, fibrinogeno, acido ialuronico, silice, asbestos.

Amplificano la risposta infiammatoria

Burke-Gaffney and Davis Critical Care 2013, 14:121
<http://ccforum.com/content/14/2/121>

COMMENTARY

Lest we forget the endothelial glycocalyx in sepsis

Anne Burke-Gaffney¹ and Timothy W Evans²

Sepsis is the third largest cause of death in industrialised countries, but treatment remains largely supportive and effective therapeutic interventions are urgently needed. Disruption and dysfunction of the microvascular endothelium leading directly or indirectly to multiple organ failure are now recognised to underpin the pathophysiology of sepsis. Biomarkers of endothelial activation may therefore assume an important role in guiding future research efforts.

We suggest that integral to this approach is the investigation and evaluation of endothelial glycocalyx biomarkers, not only as indicators of the pathogenic process but also to inform the development of pharmacological and other therapies.

DEFINIZIONE PRECEDENTE DI SHOCK SETTICO

SEPSI CON IPOTENSIONE + ACIDOSI LATTICA, OLIGURIA, TURBE COSCIENZA

DEFINIZIONE ODIERNA

Situazione con severe anomalie circolatorie, cellulari, e metaboliche associate ad elevato rischio di morte rispetto alla sepsi

Soggetti a rischio maggiore

- Età avanzata >75
- Cirrosi epatica, Diabete
- Neutropenia
- Etilismo
- Immunodepressione/AIDS
- Trapianti d'organo
- Malattie ematologiche e neoplastiche
- Manovre strumentali invasive
- Ustonati, traumatizzati, portatori di catetere.

INFEZIONI SISTEMICHE

Etiologia / Epidemiologia

Patogenesi

Clinica

Diagnosi

Terapia

Prognosi

CLINICA

Spesso aspecifica: febbre con brividi, nausea, cefalea, confusione (10-30% specie negli anziani) anche se tosse, disuria, cefalea associata a sindrome meningea, possono rivelare la patologia sottostante (polmonite, meningite, IVU)

Il paziente tipico con sepsi presenta

- Febbre
- Tachicardia
- Estremità calde
- Tachipnea
- Anoressia, nausea o vomito
- Confusione
- Oliguria

Suspect SEPSIS
Save Lives

Segni clinici della sepsi/shock settico

Parametri vitali

- Stato di coscienza
- Frequenza cardiaca e Pressione arteriosa
- Frequenza respiratoria
- Temperatura
- Diuresi

1. Fase iniziale dello "shock caldo":
vasodilatazione con portata cardiaca aumentata, tachicardia, PA normale, polso "scoccante", diuresi normale
Alterazioni miocardiche

2. Fase dello "shock freddo": marcata ipotensione con polso piccolo e frequente, toni cardiaci deboli, oliguria, cute fredda cianosi periferica, confusione mentale, polmone da shock, eventuale CID

3. Fase della Disfunzione Multiorgano -MODS

Complicanze

Disfunzione Multiorgano (MODS)

- Insufficienza renale
- Insufficienza cardiaca
- Insufficienza respiratoria (ARDS)
- Compromissione sistema nervoso, fegato ed apparato gastroenterico
- Emorragie, Trombosi, CID

SEPSI = PANENDOTELITE

Danno tissutale ← Ipossia, Ridotta perfusione, Acidosi

- rene: necrosi acuta tubulare
- polmone: ARDS
- fegato: necrosi zonale
- cervello: ischemia focale, emorragia
- gangrena periferica
- surreni: emorragia
- Intestino: ischemia, ulcere

ARDS

ARDS: complicanza nel 15-20% dei pazienti in corso di shock. E' una forma di edema polmonare la cui causa è rappresentata dall'aumento della permeabilità della membrana alveolo-capillare determinata da leucotrieni, tromboxano, prostaglandine e delle piastrine (microtrombi causa di danno endoteliale) per cui leucociti si accumulano nei capillari polmonari e invadono gli spazi aerei determinando riduzione della distensibilità polmonare (maggiore "rigidità") e atelettasia

Manifestazioni emorragiche in corso di CID

Prognosi

Shock settico

- Età > 70
- Sepsi vie urinarie
- Infezioni addominali
- Ricovero in terapia intensiva
- Antibiotico-resistenza
- Terapia antibiotica impropria
- Endotossinemia Gram-
- Elevata citochinemia

Incidenza vs **Mortalità**

Letalità

MDR

Stafilococchi coagulasi - (CONS)
Batteri Gram -, Enterococchi, Candida

DIAGNOSI SEPSI E SHOCK SETTICO

- Clinica
- Laboratorio (inclusi markers flogosi)
- Emocultura
- Esami strumentali (1-2 livello)
- RX-torace, Ecografia, TAC, RMN, Scintigrafia, PET, PET-TAC

Esami di Laboratorio

- **Esame emocromocitometrico:** leucocitosi neutrofila, leucopenia (associata a prognosi infuusta), piastrinopenia (CID)
- **Proteina C reattiva, PCT- AUMENTATI**
- **Test della coagulazione:** prolungamento del tempo di protrombina o di tromboplastina, diminuzione del fibrinogeno, aumento dei marcatori di fibrinolisi (D-dimero)

Persistenza delle alterazioni dei parametri di laboratorio nel tempo

- **Acido lattico:** aumenta (in relazione all'ipossia tissutale)
- **Emogasalisi:** alcalosi respiratoria (iniziale), acidosi metabolica, ipossia
- **Endotossine e citochine:** correlate a sepsi da Gram-negativi (di uso non routinario)
- **EMOCOLTURE**

I Markers disponibili non sono specifici di sepsi, per cui la diagnosi non può risiedere solo sulla loro rilevazione.

La presenza di alcuni parametri alterati può tuttavia aiutarci ad incrementare la probabilità diagnostica in pazienti con quadri suggestivi o tipici

PROCALCITONINA

- Prodotta dalle cellule C della tiroide e da cellule neuroendocrine extratiroidee:
 - **polmone**
 - **intestino**
 - **fegato**
 sopra/otto in corso di infezione in cui è escluso un coinvolgimento tiroideo

Emivita di 25-30 h

- Prodotta selettivamente in risposta ad infezioni batteriche (stimolo più potente è l'endotossina batterica)
- Non aumenta (se non in modo poco significativo) nelle infezioni fungine, virali, in malattie autoimmunitarie e neoplasie
- **individuo sano:** indosabile o < 0.1 ng/mL
- **paaziente infetto:** 1 - 1000 ng/mL. **Non mancano cutoff**
- Si eleva anche in corso di:
 - politrauma
 - post-operati cardiocirurgici o di chirurgia generale
 - miarto miocardio
 - arresto cardiocircolatorio
 - ustione

PROCALCITONINA

In caso di sepsi severa, la concentrazione plasmatica di procalcitonina è direttamente proporzionale alla gravità del quadro clinico

Proteina C Reattiva (PCR)

- **storicamente più utilizzata**
- **molto sensibile**
- **aspecifica, non correla alla gravità della sepsi**

Procalcitonina (PCT)

- **infezioni batteriche gravi sepsi, shock settico, MODS**
- **più specifica rispetto alla PCR nella diagnosi di sepsi**
- **correla in maniera significativa alla gravità del quadro clinico**

PROCALCITONINA RANGE DI RIFERIMENTO

Normal Values (healthy individuals) <0.05 ng/ml	Normal range for PCT (ng/ml): 100
Healthy individuals (age > 4 days of life): for moderate sepsis < 2.0 ng/ml; for moderate sepsis < 2.0 ng/ml	Normal range for PCT (ng/ml): 100
Measurable but low PCT response	Sign of non-significant systemic inflammatory reaction. Local inflammation and local infection are excluded.
PCT 0.5 to 2.0 ng/ml	Significant by moderate systemic inflammatory reaction. Infection is possible but other causes (trauma, operations) also known to induce PCT increase. Further PCT monitoring is recommended (6-24 hrs).
PCT > 2.0 ng/ml	Diagnosis of sepsis, severe sepsis or septic shock. High risk of the development of organ dysfunction. Antimicrobial treatment should be started. Frequent monitoring of sepsis. Possibly unfavorable prognosis. Daily monitoring of PCT recommended.
PCT > 10 ng/ml	Frequently associated with organ dysfunction. High risk of fatal outcome. Daily monitoring of sepsis. Frequent monitoring of PCT recommended.

G. Paternoster

Adapted from Weisner, Procalcitonin: Biochemistry and Clinical Diagnosis (Book), 2015

Surviving Sepsis Campaign (SSC) Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock

Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, Gerlach H, Calandra T, Cohen J, Gea-Banacloche J, Keh D, Marshall JC, Parker MM, Ramsay G, Zimmerman JL, Vincent JL, Levy MM and the SSC Management Guidelines Committee
Crit Care Med 2004;32:858-873
Intensive Care Med 2004;30:536-555
Crit Care Med 2008; 36; 296-327

www.sccm.org
 www.sepsisforum.com

Paziente con:

Febbre elevata
Stato confusionale
Leucocitosi/leucopenia
SO₂ ridotta
Poli/tachipnea
Ipotensione arteriosa
Oliguria

LABORATORIO IN CORSO DI SEPSI / SHOCK SETTICO

- 1) Anemia, PCT e PCR aumentati
- 2) **Leucocitosi** neutrofila (15.000-30.000/ml) a cui può seguire **leucopenia**.
- 3) Nelle infezioni da patogeni intracellulari (salmonella, brucella, listeria, virus, rickettsie) e nelle sepsi ipercute il numero dei leucociti si presenta normale o diminuito. LINFOCITOSI
- 4) **Piastrinopenia inferiore a 100.000/mm³**.
- 5) Se presente CID: marcata diminuzione del fibrinogeno, aumento di PT e PTT, presenza in circolo dei prodotti di degradazione della fibrina.
- 6) Iperazotemia: se si instaura rapidamente è segno di ipercatabolismo secondario all'infezione di insufficienza renale, comparsa inoltre ipercalcemia e spesso iperkaliemia (questa situazione richiede urgente depurazione extra renale).
- 7) Transaminasi, amilasiemia, CPK e LDH, sono spesso molto aumentate.
- 8) Disturbi dell'equilibrio acido-base: variano nelle due fasi dello shock (alcalosi respiratoria in fase ipercinetica, acidosi metabolica in fase ipocinetica)

Emocoltura

Tabella 7. Suggestioni per tempi, quantità e numero di prelievi da eseguire per le emocolture

- Prelevare le colture all'insorgenza del sintomo (brivido o febbre)
- Un intervallo di 30-60 minuti tra un set per emocoltura e un altro non sembra offrire migliori risultati rispetto a più set prelevati contemporaneamente (unica eccezione: il sospetto di endocardite)
- Prelevare per ciascuna coltura almeno 10 ml di sangue (secondo alcuni: 10-30 ml)
- Se probabilità batteremia bassa o moderata: prelevare 2 set di emocolture per ciascun episodio batteremico
- Se probabilità batteremia alta: prelevare 3 set di emocolture per ciascun episodio batteremico
- Se probabilità batteremia alta e sospetto di patologia da germe comune contaminante: prelevare 4 set di emocolture per ciascun episodio batteremico
- Se sospetto di endocardite in paziente che ha già ricevuto terapia antibiotica: prelevare 4 set di emocolture per ciascun episodio batteremico

Da: Mylotte JM, Tajar A. Blood Cultures: Clinical aspects and controversies (review). RIF. 192.

EMOCOLTURA: numero di set di E

1 fialone per aerobi + 1 fialone per anaerobi
+/- 1 fialone per miceti

REGOLA: mai ottenere 1 solo set

Il tasso di contaminazione di un unico set di E varia dall'1 al 4.5%
[Int care Med 2001; 27: S10]

Conservare le emocolture per 4 settimane

Emocolture a Monitoraggio Continuo: Tempi medi di Individuazione

MIRVET S et al J Clin Microbiol 2003; 41:2391-2394

Sviluppo e crescita lenta (sup. a 5-7 gg.) e/o assenza di sviluppo in condizioni "standard": esempi

Bacilli Gram-

- *Bartonella spp.*
- *Brucella spp.*
- *Borrelia spp.*
- *Legionella spp.*
- *Francisella spp.*
- *Bordetella holmesii*

+ gruppo "HACEK"

- H** *Haemophilus spp*
- A** *Actinobacillus actinomycetemcomitans*
- C** *Cardiobacterium hominis*
- E** *Eikenella corrodens*
- K** *Kingella kingae*

**Crescita
lenta**

Cocchi Gram +
Abiotrophia spp.
Granulicatella spp.

Bacilli Gram +
Bacillus hackensackii
altri
Mycoplasma spp.
Mycobacterium spp.

POSITIVE BLOOD CULTURES IN SEVERE SEPSIS

Può essere falsamente negativa per:

- ♦ terapia antibiotica in atto
- ♦ volume di sangue insufficiente
- ♦ intermittenza dell'agente patogeno in circolo
- ♦ microrganismi non coltivabili

LightCycler® SeptiFast

Med Microbiol Immunol
DOI 10.1007/s00430-007-0063-0

ORIGINAL INVESTIGATION

A multiplex real-time PCR assay for rapid detection and differentiation of 25 bacterial and fungal pathogens from whole blood samples

Lutz Eric Lehmann · Klaus-Peter Hunfeld · Thomas Ehrlich · Gerd Haberhausen · Heimo Wisting · Andreas Hoeffl · Frank Stuber

Received: 29 June 2007
© Springer-Verlag 2007

LightCycler® Sangue intero SeptiFast

Purificazione del DNA

PCR real-time

Gram (-)	Gram (+)	Funghi
<i>Escherichia coli</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Candida albicans</i>
<i>Legionella pneumophila (sp. nov.)</i>	CoNS*	<i>Candida tropicalis</i>
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Staphylococcus pneumoniae</i>	<i>Candida parapsilosis</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>Streptococcus spp.</i>	<i>Candida glabrata</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Candida lusitana</i>
<i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Aspergillus fumigatus</i>
<i>Serratia marcescens</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	
	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	
	<i>Streptococcus agalactiae</i>	
	<i>Streptococcus pyogenes</i>	
	<i>Streptococcus mitis</i>	

MRSA (mecA)

~ 90% dei microrganismi isolati

Spettrofotometria MALDI-TOF

Il sistema è costituito da

- Sorgente (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization)
- Analizzatore (Time Of Flight)
- PC

Fornisce accurate informazioni su struttura e peso molecolare di biomolecole:

- peptidi
- proteine
- oligonucleotidi
- carboidrati
- polimeri sintetici

ID microbica rapida (pochi minuti)

Il "Sepsis Bundle" è un "Pacchetto di interventi" composto da un gruppo di azioni che, se poste in atto insieme, comportano un outcome migliore rispetto al loro utilizzo individuale.

Diagnosi clinica **Trattamento tempestivo**

Serie di azioni da eseguire entro le prime 6 ore - 24 ore

Mortality

Gen F. Mealy, T. Daniels, CF, et al: The impact of compliance with 6-hour and 24-hour sepsis bundles on hospital mortality in patients with severe sepsis: a prospective observational study. Crit Care. 2002; 7:1044-1050

SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN BUNDLES

- Within 3 hours of the diagnosis of sepsis, health care providers should (a) measure a serum lactate level, (b) obtain blood cultures (before starting antibiotics), (c) **start broad spectrum antibiotics**, and (d) bolus a patient with 30 mL/kg of crystalloid for patients who are hypotensive or have an elevated serum lactate.
- Within 6 hours, the following interventions should be initiated: (a) start vasopressors for hypotension that is refractory to volume resuscitation to maintain a mean arterial pressure greater than 65 mm Hg, (b) reassess intravascular volume status, and (c) remeasure lactate if initial lactate was elevated.
- These simple interventions have been demonstrated to markedly decrease mortality in a database of nearly 30,000 patients

- ### I DIECI COMANDAMENTI DELLO SHOCK
- 1) Esaminare il paziente
 - 2) Assicurare la pervietà delle prime vie aeree
 - 3) Aggiustare la massa di sangue (volume circolante) con trasfusioni e infusioni isotoniche, tenendo conto dell'ematocrito, da diuresi oraria (con catetere vescicale adomora), la PVC e preferibilmente la PAPB
 - 4) Sorvegliare e correggere le concentrazioni amatiche di Na+, K+, Ca2+, HCO-3 e Cl e anche della **potassiemia** se hanno valori alterati
 - 5) Se la PVC sale, mentre persiste l'ipotensione arteriosa, iniziare la terapia digitalica (per infusione a goccia)
 - 6) Sorvegliare l'emogasanalisi (specie l'ossimetria del sangue arterioso)
 - 7) Correggere l'insufficienza respiratoria con l'inalazione di O2 opportunamente miscelato all'aria (se la PaO2 è scesa tra 70 e 80mmHg).
 - 8) Non impiegare vasopressori (noradrenalina, metaraminolo ecc...) ma piuttosto isoproterenolo, sorvegliando la frequenza del polso
 - 9) Sospettare la natura settica dello shock quando la sua causa è oscura. In ogni caso **tenere d'occhio la temperatura (meglio termometria rettale)**
 - 10) **Somministrare un antibiotico ad ampio spettro, eliminare la porta d'ingresso del germe e correggere la terapia sulla base dell'antibiogramma.**

Patogeni resistenti alla terapia

Si definiscono Multi-Drug Resistant Organisms i patogeni (prevalentemente batteri) resistenti a una o più classi di agenti antibiotici.

- S. aureus meticillino-resistente [MRSA]
- Enterococco vancomicino-resistente [VRE]
- S. aureus a resistenza intermedia verso la vancomicina [VISA]
- S. aureus vancomicino-resistente [VRSA]
- S. pneumoniae multiresistente [MDRSP]
- Altri gram-negativi multiresistenti [MDR-GNB]
 - Da ricordare i produttori di beta lattamasi a spettro esteso [ESBL]
 - Acinetobacter baumannii

Il sistema di trasmissione sembra essere lo stesso di batteri non MDR, nelle strutture ospedaliere, hanno una alta prevalenza, come è ormai documentato. *Journal of Infection Control Practice, Advisory Committee, Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings, CDC 2006*

- ### ALERT ORGANISMS
- Bacilli acido-alcool resistenti da campioni respiratori (esame microscopico e culturale) senza precedenti
 - Clostridium difficile (tossina nelle feci)
 - Enterobatteri con beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL)
 - Enterococco sp. Resistente a Vancomicina (VRE)
 - E. coli produttori di VT*
 - Germi multiresistenti (sensibili ad uno solo degli antibiotici saggiati routinariamente)
 - Legionella *
 - Neisseria Meningitidis (siti sterili)
 - Staphylococcus aureus con resistenza o sensibilità intermedia ai glicopeptidi (GRSA/GISA)
 - Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)*
 - Strept. pneumoniae penicillino intermedio o resistente (siti sterili)

INFEZIONI SISTEMICHE

Etiologia / Epidemiologia

Patogenesi

Clinica

Diagnosi

Terapia

Prognosi

Slide 11/308

TERAPIA AB EMPIRICA PRECOCE

- ❖ Dose piena di carico di ATB e.v.
- ❖ Monitoraggio [] seriche (insuff.epatica o renale – aumento del volume di distribuzione)
- ❖ Scelta in base a:
 - anamnesi (es. recente ABT)
 - comorbidità
 - contesto clinico

(infesz. comunità [ricovero < 48 h] o ospedaliera)

- sito di infezione sospettato

- pattern di resistenza locali

- Gram stain e MIC

- caratteristiche PK/Pd

Caratteristiche farmacodinamiche degli antibiotici

- Tempo dipendenti**
 - ☐ Beta-lattamine
 - ☐ Glicopeptidi
 - ☐ Linezolid
 - ☐ Macrolidi
- Concentrazione-dipendenti**
 - ☐ Fluorochinoloni, Daptomicina
 - ☐ Aminoglicosidi, Ketolidi

- ❖ Durata della ATB : 7-10 gg; > se risposta clinica lenta o foci di infezioni non drenabili o immunodeficienze
- ❖ Terapia empirica di combinazione iniziale: se sepsi grave/shock settico oppure sospetto di Pseudomonas o neutropenia
- ❖ Dopo AB gamma (3-5 gg) restringere lo spettro di azione (de-escalation) .

Tempo di risposta delle emocolture

- ✓ 85 % delle BSI positive entro 24 ore di incubazione in termostato
- ✓ Per Candida e anaerobi come Clostridi e Bacteroides 2 -3 giorni di incubazione
- ✓ Il tempo di incubazione standard di 6 giorni consente la crescita del 99% dei batteri
- ✓ La ATB raddoppia o triplica i tempi di crescita o impedisce tot. le crescite

TERAPIA EMPIRICA DELLE SEPSI

SEPSI AD ORIGINE IGNOTA PAZIENTE IN COMUNITA'	*CEFOTAXIME CEFTRIAXONE CEFEPIME *GENTAMICINA	*AMOXICILLINA/CLAVULANATO * AMPICILLAN SUBACTAM GENTAMICINA	
SEPSI AD ORIGINE IGNOTA PAZIENTE OSPEDALIZZATO	* CEFTAZIDIME CEFEPIME IMPIPENEM/ MEROPENEM PIPERACILLINA /TAZOBACTAM * AMIKACINA CIPROFLOXACINA LEVOFLOXACINA * VANCOMICINA TELICOPLANINA	* TELICOPLANINA VANCOMICINA	BETAIATTAMINA AD AMPIO SPETTRO

TERAPIA EMPIRICA DELLE SEPSI

ORIGINE DAL POLMONE PAZIENTE IN COMUNITA'	CEFOTAXIME CEFTRIAXONE * CLARITROMICINA AZITROMICINA LEVOFLOXACINA
ORIGINE DAL POLMONE POLMONE NOSOCOMIALE	CEFTAZIDIME CEFEPIME IMIP / MEROPENEM PIP / TAZOBACTAM * * AMIKACINA CIPROFLOXACINA LEVOFLOXACINA * VANCOMICINA TELICOPLANINA

TERAPIA EMPIRICA DELLE SEPSI

UROSEPSI PAZIENTE IN COMUNITA'	AMOXICILLINA/CLAVULANATO CIPROFLOXACINA/LEVOFLOXACINA CEFOTAXIME		
UROSEPSI NOSOCOMIALE	FLUOROCINOLONE CIPROFLOXACINA/LEVOFLOXACINA CEFTAZIDIME/CEFEPIME PIPERACILLINA /TAZOBACTAM * * AMINOSIDE	* *	* *

TERAPIA EMPIRICA DELLE SEPSI

SEPSI IN TOSICO-DIPENDENTI	OXACILLINA TELICOPLANINA VANCOMICINA * GENTAMICINA
SEPSI IN SEPLENICI/TOSSIZATI	CEFOTAXIME CEFTRIAXONE CEFEPIME

SPERANZE TERAPEUTICHE

- Anti- TNF- α
- Anti - Interleuchina 1 (IL-1)
- Antagonisti endotossina A
- Proteina anticoagulante C attivata
- Inibitori ciclossigenasi
- Prostaglandina E-2
- Inibitori sintesi NO
- Antitrombina III

Proteina C attivata umana ricombinante (rhAPC)

È il farmaco più importante per ridurre la letalità nella sepsi grave probabilmente per i suoi effetti anti-shock settico, di prevenzione della disfunzione d'organo

Rischio maggiore: sanguinamento

Analisi costo-beneficio: indicazione solo nel caso di APACHE II score >25, ARDS, MOF, shock settico

Outcome è influenzato da:

- Risposta dell'ospite : febbre, leucopenia...
- Comorbidità : cirrosi, diabete , insuff. cardiaca, IRC...
- Età
- Sito di infezione : urosepsi vs infez. polmonare
- Risultato delle emocolture
- Tipo di MO : infezioni nosocomiali vs comunitarie - MRSA vs MSSA vs Pseudom. vs Acinetobacter
- Terapia antibiotica
- Sepsis care bundle nella sepsi severa

Interventi di gestione successiva e terapie addizionali

Steroidi se shock

rhAPC

Ventilazione protettiva se ALI/ARDS

Glicemia <150 mg/dl

Entro le prime 24 h

STEROIDI e SEPSI SEVERA/SHOCK SETTICO

- l'impiego di **steroidi ad alte dosi** (es. METILPREDNISOLONE 30 mg/kg o IDROCORTISONE > 300 mg/die) **non migliora la sopravvivenza** potendo risultare, al contrario, dannosa per il **rischio di infezione** cui espone

Cosimi L. et al. Crit Care Med 1995;23:1430-9
 Dellinger RP et al. Intensive Care Med 2004;30:536-55
 Hutchings RS et al. N Engl J Med 2003;348:138-50