DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Corso di

Laurea in Ostetricia

C.I. “Fisiopatologia del parto e neonatologia”

Scienze Ostetrico ginecologiche

La CTG: management ostetrico

Alcune puntualizzazioni

In presenza di un tracciato normale, la probabilità che il feto sia in ipossia o acidosi è remota

Viceversa, in presenza di un tracciato suggestivo per ipossia o acidosi, il feto nasce spesso in ottimo stato e non è in acidosi.

quindi

il termine “*distress fetale*” non viene più usato e si parla invece di “*condizione fetale non rassicurante*”.

L’uso inappropriato del termine può prestarsi ad un contenzioso medico legale

NORMALE OSSIGENAZIONE

IPOSSIA

ACIDOSI

DANNO TISSUTALE

Asfissia alla nascita e danno neurologico (ACOG)

- Acidosi metabolica alla nascita ($\text{pH} < 7$, deficit basi > 20)
- Apgar al 5' minuto < 3
- Sequele neurologiche neonatali (convulsioni, ipotonia)
- Disfunzione multiorgano (rene, cuore, polmone)

Si raccomanda il pH alla nascita:

- A tutti i neonati depressi;
- A quelli con tracciato non rassicurante prima della nascita, specialmente in caso di parto operativo;
- In caso di liquido fortemente tinto di meconio.

Problematiche della CTG

- L'interpretazione è difficile;
- Richiede una buona conoscenza della fisiologia ed **esperienza**;
- L'analisi della CTG deve basarsi su i dati clinici;
- Non conferisce alcun vantaggio se le informazioni non sono utilizzate correttamente

Interventi per CTG non rassicurante

- Somministrazione di ossigeno alla madre (l'ossimetria non ha dimostrato buoni risultati)
- Decubito laterale
- Idratazione (ottimizzazione del volume intravascolare e quindi della perfusione uterina)
- Farmaci tocolitici in caso di ipertono (efficacia transitoria e possibile intolleranza fetale al travaglio)

Il meconio

- Possibile segno di ipossia fetale, variabile in rapporto all'età gestazionale
- Dannoso se inalato dal feto durante i *gaspings*
- In caso di oligoidramnios il meconio è più denso
- La compressione del funicolo comporta un'ulteriore ipossia e quindi passaggio di meconio (utilità dell'amnioinfusione)

Comunque il passaggio di meconio non predice il danno cerebrale

Valutazione delle contrazioni

- Frequenza (tachisistolia se più di 5 contrazioni in 10 minuti)
- Durata (se maggiore a 90")
- Aumento tono di base

Marcate accelerazioni

> di 30 bpm, durata 30'' .
L'accelerazione denota un' insolita risposta dei barocettori all' ipotensione con diminuzione del pH

Apgar 7/9
giro di funicolo

Accelerazioni atipiche con bradicardia basale

L'accelerazione atipica sembra una "variabile" capovolta

La variabilità è conservata

Denota un feto stressato

Chiudere l'ossitocina!

Apgar 8/9,
3600 g, giro di
funicolo

Progressione da accelerazione a decelerazione variabile

PS,,Apgar 8/9,
Giro di funicolo

Decelerazioni tardive con buona variabilità

Lieve ipossia

Se il parto non è imminente, preparare il TC

Forcipe,
meconio
2693 g
Apgar
6/8

Decelerazioni tardive con variabilità assente

Linea di base non riconoscibile

TC immediato

TC, neonato
2722 g, Apgar
1/7, intubato, poi
dimesso in buone
condizioni

Decelerazioni tardive lievi

La depressione miocardica impedisce al feto di rispondere a stimoli ipossici. TC, ma è già troppo tardi

TC, 42 settimane, 1630 g, Apgar 1/1, deceduto dopo 15 giorni

Decelerazioni variabili non uniformi

Scarsa variabilità
Cambiare il decubito!

TC, 3400 g , Apgar
2/6, giro stretto di
funicolo, polipnea,
ossigenoterapia

Decelerazioni variabili lievi

La linea di base è conservata
Costante osservazione!

TC, 3218 g,
Apgar 9/10,
esito normale

Decelerazioni variabili moderate

Cambiare il decubito materno
Ridurre le contrazioni
Fare attenzione alla variabilità

PARA 2002

Parto precipitoso, 2450 g

Apgar 8/9

Decelerazioni variabili gravi

PARA 2002, 35 settimane,
parto spontaneo, 2381 g,
Apgar 9/9, 2 giri di funicolo

Buona variabilità

Aspetto classico

Grande probabilità di
impegno del cordone

Decelerazioni variabili gravi

Tachicardia moderata,
variabilità normale.

Parto spontaneo o TC ?

PARA 2002, parto
spontaneo, 2860 g,
Apgar 8/9, giro di
funicolo

Decelerazioni variabili con perdita dell' accelerazione iniziale

30% dei neonati ha un Apgar < 7 a 1', ma meno di 7% ha un Apgar < 7 a 5'

PARA 2002, parto spontaneo, 2570 g, Apgar 6/9, L.A. tinto, giro di funicolo

Decelerazioni variabili bifasiche

48% dei neonati con basso Apgar ad 1' e 12% di persistenza a 5'

La variabilità conservata è rassicurante

PARA 2002, parto spontaneo, 2800 g, Apgar 6/8, due giri di funicolo

Variabili con variabilità assente

67% dei feti ha un Apgar basso

22% lo mantiene a 5'

Ricorrere al TC

Corioamnionite, parto spontaneo, 2180 g a 34 settimane, Apgar 1/5, due giri di funicolo

Quindi....

- Nel periodo dilatante, in presenza di decelerazioni variabili “non rassicuranti”, passare a un management di azione
- Nel periodo espulsivo, se la linea di base ha una buona variabilità e mantiene una frequenza regolare, cambiare il decubito e non far spingere ad ogni contrazione

Cause di decelerazioni prolungate

- Visita
- Ipotensione materna
- Prolasso del funicolo
- Compressione del cordone associata a rapida discesa del feto
- Rottura d' utero
- Distacco di placenta

Decelerazione con ipotensione materna

Ipotensione supina, risolta cambiando il decubito

PARA 0000, parto spontaneo, 3800 g, Apgar 9/9, esito normale

Decelerazioni con tachisistolia

Decelerazione di 10', tachicardia compensatoria con aumento della variabilità, poi diminuzione della variabilità

TC 2600 g,
Apgar 2/9
meconio
pH 7,31

Decelerazione da distacco di placenta

Decelerazione di 8' fino a 74 bpm, contrazioni senza pausa

34 settimane,
TC, 2040 g, pH
6.9, Apgar 2/4

E per finire....

Una causa frequente di scarsa relazione fra tracciato ed outcome neonatale è un eccessivo intervallo di tempo tra la fine della registrazione e la nascita

Esercizi per casa

Bibliografia di riferimento

[Obstet Gynecol.](#) 2006 Sep;108(3 Pt 1):656-66.

Intrapartum electronic fetal heart rate monitoring and the prevention of perinatal brain injury.

[Graham EM](#)¹, [Petersen SM](#), [Christo DK](#), [Fox HE](#).

<http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50>