L'esercizio di resistenza

Biochimica metabolica dello sport e dell'esercizio fisico

Edizione digitale

Don MacLaren • James Morton

Edizione italiana a cura di Alberto Passi

edi-ermes

L'esercizio fisico di resistenza

➤ **l'esercizio di resistenza** è un esercizio di intensità costante, prolungato, con una durata variabile tra 4 min e 4 ore (Whyte, 2006)

comprende **attività sulla media distanza** (per esempio **ciclismo su pista**, **canottaggio** e **nuoto**) e **lunga distanza** (**corsa della maratona** e a **lunghe tappe ciclistiche su strada**, come quelle del Giro d'Italia)

➤ **l'esercizio di ultra-resistenza** ha durata superiore alle 4 ore, comprende attività come il **triathlon dell'Ironman** o la **ultra-maratona** (100Km del passatore)

l'intensità dell'esercizio è costante: lo scopo degli atleti è quello di allenarsi alla massima potenza possibile per un tempo più lungo possibile.

Produzione di energia negli esercizi di resistenza

Il **ripristino dell'ATP** impiega il **metabolismo ossidativo di carboidrati e lipidi** forniti da:

- **fonti intramuscolari**
 - **glicogeno** muscolare
 - **trigliceridi** intramuscolari (**IMTG**)
- **fonti extramuscolari**
 - **acidi grassi liberi** plasmatici (FFA - derivati dalla lipolisi del tessuto adiposo)
 - **glucosio** plasmatico (dal glicogeno epatico o dal glucosio alimentare).

Le **proteine** (aminoacidi) contribuiscono solo per una piccola % alla produzione di ATP durante l'esercizio (**5%**)

Regolazione metabolica durante l'esercizio di resistenza

- la **disponibilità dei substrati** - controllati dalla dieta e dagli ormoni chiave - catecolamine e l'insulina

- l'**abbondanza dei trasportatori dei substrati** attraverso le membrane cellulari e mitocondriali

- l'**attività degli enzimi chiave** coinvolti nelle vie metaboliche

Meccanismi che modificano l'attività delle differenti vie energetiche

- di **regolazione immediata** delle vie che modulano l'attività degli enzimi di comando delle vie di produzione dell'energia
 - fosforilazioni e defosforilazioni degli enzimi principali
 - modulatori allosterici (ADP, AMP, IMP, Pi, Ca²⁺, H⁺)
 - concentrazione dei substrati (un aumento li attiva)
 - concentrazione dei prodotti (un aumento li inibisce)
- di **regolazione ormonale** (insulina, adrenalina)
- di **adattamento al tipo di esercizio** (ALLENAMENTO)

ALLENAMENTO

Variabili dell'allenamento che influenzano la biochimica delle vie di produzione dell'energia:

- l'**intensità dell'esercizio**
- la **durata**
- lo **stato nutrizionale**
- il **livello di allenamento**

Per definire l'intensità dell'esercizio ...

di resistenza

ALLENAMENTO

di forza

25-90 %

VO2max

100%

VO2max

130 %

VO2max

SOTTO

massimale

massimale

(stato attuale)

SOPRA

massimale

25-45-65-80-90 %

all-out

**Modificazioni
metaboliche
causate dall'intensità
dell'esercizio**

Effetto dell'intensità dell'esercizio

il contributo dei carboidrati e dei lipidi nella produzione di ATP varia in funzione dell'intensità dell'esercizio

25% ← **VO2max** → 90 %
sotto massimale

A maggiori intensità dell'esercizio (a ritmi più elevati, che richiedono grandi quantità di energia e contrazione alla massima velocità possibile) **predomina il contributo dei carboidrati** mentre **cala il contributo dei lipidi**

L' **aumento della richiesta di ATP** produce **ADP** e **AMP** → attivano la glicolisi
 aumenta l'attività di **PDH** ← aumenta PIR

25% ← **VO2max** → 90%

aumenta il consumo di ATP

aumenta l'attività di PDH

Aumenta l'ossidazione del glucosio attraverso la glicolisi

Aumenta l'ossidazione aerobica del piruvato (ciclo di Krebs)

(a) aumenta l'ossidazione aerobica del glucosio

il contributo dei lipidi alla produzione di ATP diminuisce ad intensità di esercizio >65% VO₂max

25% ← VO₂max → 90%

65%

(b) **diminuisce il livello di FFA plasmatici**

sfuerzo intenso (>65% VO₂max): **aumenta il flusso ematico verso i muscoli** → arriva poco sangue al tessuto adiposo → arriva **poca ALBUMINA necessaria per il trasporto degli FFA** (la lipolisi è comunque attiva → NB si produce glicerolo che va in circolo poiché non necessita di albumina)

(c) diminuisce l'ossidazione dei lipidi

sforzo intenso (>65% VO2max): **cala l'ossidazione dei lipidi** (beta-ox) **nel muscolo**

Cala l'attività della CAT1

perché?

Il **maggiore afflusso di piruvato** proveniente dal glucosio **augmenta l'attività di PDH** → **augmenta l'acetilCoA** proveniente dal glucosio → che **eccede la velocità di utilizzo nel ciclo di Krebs** → l' **eccesso di acetilCoA potrebbe inibire la PDH** → il muscolo non potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico richiesto dall'intensità dell'esercizio (>65% VO₂max)

la **carnitina assorbe l'eccesso** di acetylCoA prodotto, **diventando acetyl-carnitina** → non è più libera per trasportare gli acidi grassi

→ **cala la disponibilità di CARNITINA**

La **carnitina è un substrato dell'enzima CAT1**, indispensabile per il trasporto degli FFA a catena lunga (ma non quelli a <C12) attraverso la membrana mitocondriale interna → cala il flusso di FFA verso il mitocondrio → la **beta-ox rallenta** (alimentata ora solo dagli FFA <C12).

In definitiva, la biochimica ci insegna che:

«se aumento il ritmo di un esercizio di resistenza consumo in modo preferenziale il glucosio»

Per cui prima di un allungo... se voglio sostenerlo ... sarebbe consigliabile integrare con carboidrati prima e durante

**Modificazioni
metaboliche
prodotte dalla
durata dell'esercizio**

Effetto della durata dell'esercizio

*contributo dei carboidrati e dei lipidi nella produzione di ATP
in funzione della durata dell'esercizio (<65% VO₂max)*

10 min tempo ore

L'esercizio a prolungato nel tempo (a intensità costante)

- **aumenta l'ossidazione lipidica**
- **riduce la velocità di ossidazione dei carboidrati**

2 ore

tempo

4 ore

Aumento della durata dell'esercizio → riduce l'attività della PDH

il **glicogeno** muscolare ed epatico è **ormai consumato** ed è ridotta anche l'attività gluconeogenica del fegato (alimentata solo dalla degradazione delle proteine)

La difficoltà a mantenere livelli glicemici adeguati stimola la produzione di **glucagone** che **blocca** la **PK** impedendo la produzione di **piruvato**

57 % VO₂max

cala l'attività della PDH → si riduce la produzione di acetil-CoA derivato dagli zuccheri

L'esercizio prolungato nel tempo consuma il glucosio → riduzione dei livelli di piruvato → riduzione dell'attività della PDH → si riduce il livello di acetilCoA derivato dai carboidrati → la acetil-carnitina ritorna ad essere carnitina → ritorna ad essere disponibile per la CAT1 → aumento beta-ox

«Il muscolo inizia dal dolce, ma quando finisce ...passa al salato»

**Modificazioni
metaboliche
prodotte dalla
stato nutrizionale**

Poichè l'apporto dei carboidrati o dei lipidi prevale a seconda della durata dell'esercizio fisico, si usano strategie nutrizionali differenti a seconda della distanza da percorrere

Protocolli per incrementare i carboidrati

Gli atleti impegnati in esercizi di resistenza adottano spesso un **regime dietetico di carico dei carboidrati**, così da **umentare la scorta di glicogeno muscolare**.

Vengono svolti esercizi fino allo sfinimento intesi a esaurire le scorte di glicogeno, seguiti da una dieta ricca di carboidrati per indurre una grande velocità di **resintesi di glicogeno** che arriva **a livelli maggiori** rispetto alla situazione precedente.

Tale regime alimentare, assunto non solo in prossimità delle gare, **permette di sostenere carichi di lavoro maggiori** anche durante gli allenamenti (aumenta l'allenabilità dell'atleta)

Effetto dello stato nutrizionale

LG = basso contenuto di glicogeno muscolare

HG = alto contenuto di glicogeno muscolare

Il metabolismo aumenta il consumo dei carboidrati (anche in condizioni di esercizio <65% VO₂max in cui in condizioni normali in cui prevale il consumo dei lipidi)

In caso di **esercizio di resistenza prolungata** l'ossidazione dei carboidrati diventa meno importante e **cresce l'importanza del contributo dei LIPIDI**

Si usano strategie nutrizionali per aumentare la disponibilità di FFA e l'ossidazione lipidica.

Adattamento lipidico: dieta ad alto contenuto di grassi (e basso contenuto di carboidrati, come la **chetogenica**) per un periodo fino a due settimane, durante il quale si eseguono un protocollo di allenamento normale per intensità e volume, seguito da una dieta per 13 giorni ad alto contenuto di carboidrati accompagnata da una forte riduzione dell'allenamento → in queste condizioni i carboidrati vengono trasformati in grassi

adattamento lipidico

La **dieta a contenuto prevalente di lipidi (x6 gg)**

➔ **aumenta l'ossidazione dei lipidi**

➔ **riduce l'ossidazione dei carboidrati**

durante l'esercizio svolto nonostante sia stato ripristinato il livello dei carboidrati al giorno 6

Nella dieta a carico lipidico il **muscolo si è adattato ad utilizzare i lipidi** come fonte prevalente e di conseguenza permette un **risparmio di glicogeno**

dieta prevalenza di lipidi
dieta mista (lipidi e carboidrati)

Effetti prodotti dalla dieta a carico dei lipidi

- aumento di FFA e glicerolo plasmatici
(aumento della lipolisi nel tessuto adiposo)
- aumento del contenuto di trigliceridi intramuscolari
- aumento dell'attività della HSL nel muscolo a riposo
(aumento della lipolisi nel muscolo)

L'adattamento lipidico quindi, attraverso un aumento cronico della disponibilità di FFA plasmatici (dovuto al consumo di una dieta ricca di grassi), **aumenta la capacità muscolare di sintetizzare trigliceridi e di metabolizzarli.**

Il ridotto utilizzo dei carboidrati comporta una ridotta attività della PDH anche durante l'esercizio

Può rappresentare un problema

Il vulnus della dieta a carico dei lipidi nello sport

Gare caratterizzate da lunghi tratti a ritmo lento ma anche da brevi tratti di esercizio fisico ad alta intensità (sprint) richiedono un'elevata velocità di ossidazione dei carboidrati (e quindi dell'attività di PDH)

- p.e. gare di ciclismo con arrivi in volata -

**Modificazioni
metaboliche
prodotte dallo
stato di
allenamento**

Effetti dello stato di allenamento

L'allenamento di resistenza causa un elevato numero di adattamenti sia fisiologici sia metabolici

Fisiologici: aumento dell'assorbimento massimale dell'ossigeno, ritardo nel raggiungimento della soglia del lattato

Metabolici: aumento delle dimensioni e del numero dei mitocondri, per produrre ATP attraverso il metabolismo ossidativo; **aumento** della densità capillare, **delle proteine di trasporto dei substrati**, dell'attività degli enzimi coinvolti nelle principali vie metaboliche, **della capacità del muscolo scheletrico di depositare glicogeno e trigliceridi**; **riduzione dell'uso dei carboidrati con un concomitante aumento dell'ossidazione lipidica.**

Metabolismo dei carboidrati

Consumo di glicogeno nei primi 15 min di esercizio a 80% VO₂max, eseguito prima (PRE) e dopo (POST) 7 settimane di allenamento

La riduzione della glicogenolisi rilevata dopo l'allenamento è dovuta a meccanismi allosterici (ridotto contenuto di ADP, AMP e Pi) che portano ad una ridotta attività della glicogeno fosforilasi.

l'allenamento riduce l'uso del glicogeno

l'allenamento riduce l'uso del glucosio

riduce la produzione di piruvato

riduce l'attività della PDH

l'allenamento riduce il consumo di glucosio per riduzione dell'attività della glicolisi e della PDH

l'allenamento riduce l'uso del glucosio → dimostrato anche dai livelli di glucosio ematici (minor ipoglicemia da esercizio)

Livelli di glicemia dopo 90 min di esercizio al 60% VO₂max, eseguito prima (PRE) e dopo (POST) 5 o 31 gg di allenamento

ipoglicemia di minor entità

(a)

Metabolismo dei lipidi

- l'allenamento di resistenza sposta il consumo dai carboidrati ai lipidi (maggiore ossidazione dei lipidi)

L'allenamento aumenta il consumo di FFA plasmatici

Il muscolo allenato assorbe più efficientemente gli FFA plasmatici

**l'allenamento
aumenta
l'assorbimento
muscolare di FFA**

l'allenamento di resistenza:

- incrementa il contenuto proteico di FABP_{pm} e FAT/CD36, due trasportatori degli FFA nel muscolo
- **aumenta la lipolisi dei depositi di trigliceridi intramuscolari (IMTG)**

- **aumenta la lipolisi dei depositi di trigliceridi intramuscolari (IMTG)**

Il muscolo in seguito all'allenamento di resistenza esprime maggiori livelli della **lipasi dei trigliceridi del tessuto adiposo (ATGL)** che incrementa la lipolisi di IMTG

aumenta il trasporto degli FFA a catena lunga nel mitocondrio

la percentuale di oleato assorbito e ossidato è più alta nei soggetti allenati rispetto a quelli non allenati.

Al contrario, l'assorbimento e l'ossidazione di octanoato non era diversa nei diversi stati di allenamento.

aumenta l'attività di CAT1

Materiale didattico di supporto

- Materiale delle lezioni sarà reperibile nel minisito dell'insegnamento; esso è utile come traccia degli argomenti svolti, ma non sostituisce il libro di testo
- Piattaforma on line Moodle: approfondimenti e test di autovalutazione

Raccomandazione importante: Il materiale delle lezioni è per USO PERSONALE dello studente iscritto al corso di Biochimica per le Scienze Motorie UniFE ed è fatto divieto di diffonderlo in qualsiasi maniera, potendo contenere immagini/filmati per i quali valgono i diritti di copyright.