Richiami di Teoria dei Gruppi

CHEMICAL APPLICATIONS OF GROUP THEORY

F. Albert Cotton

Department of Chemistry, Texas A&M University
College Station, Texas

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1	$\sqrt{z}$	$x^2 + y^2, z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	$(x^2 - y^2, xy)$
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)

Asse di rotazione impropria (o rotoriflessione)

(i) Three S_4 axes coinciding with the x , y , and z axes. Each of these generates the operations S_4 , $S_4^2 = C_2$, and S_4^3 .

(ii) Three C_2 axes coinciding with the x , y , and z axes, each of which generates an operation C_2 . These operations have already been generated, however, by the S_4 's.

(iii) Four C_3 axes, each of which passes through one apex and the center of the opposite face. Each of these generates C_3 and C_3^2 operations, that is, eight operations in all.

(iv) Six planes of symmetry, each of which generates a symmetry operation.

The entire set of operations thus consists of the following 24, which are listed by classes (as will be explained in Section 3.13):

$$E, 8C_3, 3C_2, 6S_4, 6\sigma_d$$

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)
T_2	3	0	-1	-1	1	(xy, xz, yz)

Figure 3.1 A tetrahedral AB_4 molecule.

Figure 3.10 A five-stage procedure for the symmetry classification of molecules.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

Il numero delle rappresentazioni irriducibili è uguale al numero delle classi del gruppo.

Nel gruppo C_{2v} abbiamo 4 classi corrispondenti a operazioni di simmetria distinte, quindi abbiamo 4 rappresentazioni irriducibili.

L'ordine del gruppo (h) corrisponde alla somma delle dimensioni delle rappresentazioni irriducibili.

$$h = \sum_i l_i^2$$

Teorema di grande ortogonalità

$$\sum_R [\Gamma_i(R)_{mn}] [\Gamma_j(R)_{m'n'}]^* = \frac{h}{\sqrt{l_i l_j}} \delta_{ij} \delta_{mm'} \delta_{nn'}$$

Gli elementi di matrice delle rappresentazioni sommate
Sulle operazioni del gruppo di comportano come vettori
ortonormali.

Conseguenza

$$\sum_R \chi_i(R) \chi_j(R) = 0$$

Le rappresentazioni irriducibili sono ortogonali

$$\sum_{p=1}^k \chi_i(R_p) \chi_j(R_p) g_p = h \delta_{ij}$$

Dove g_p è il numero di elementi nella classe

Otteniamo le rappresentazioni del gruppo C_{3v}

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y)(R_x, R_y)$	$(x^2 - y^2, xy)(xz, yz)$

Per esempio il gruppo C_{3v} ha 3 classi di operazioni, deve quindi avere 3 rappresentazioni. Una sarà sicuramente l'identità (ovvero la rappresentazione total simmetrica)

L'ordine del gruppo è quindi $1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 = 6$

Quindi dobbiamo avere $l_2^2 + l_3^2 = 5$. Questo è possibile solo se una rappresentazione è monodimensionale (A_2) e l'altra è bidimensionale (E).

E' anche possibile scrivere le rappresentazioni da considerazioni geometriche, Osservando le trasformazioni di particolari funzioni, che sono riportate a destra della tavola

Il teorema di ortogonalità consente di stabilire la composizione di una rappresentazione Riducibile $\chi(R)$, calcolando quante volte una rappresentazione irriducibile $\chi_i(R)$ compare in essa secondo la formula

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R) \chi_i(R)$$

Operatori di Proiezione

$$\hat{R}\phi_i^i = \sum_s \phi_s^i \Gamma(R)_{st}^i$$

$$\phi_1^i, \phi_2^i, \dots,$$

Sono basi per le rappresentazioni
Irriducibili

$$\sum_R [\Gamma(R)_{s't'}^i]^* \hat{R}\phi_i^i = \sum_R \sum_s \phi_s^i \Gamma(R)_{st}^i [\Gamma(R)_{s't'}^i]^*$$

Ricordando il G.O.T.

$$\sum_R \Gamma(R)_{st}^i [\Gamma(R)_{s't'}^i]^* = \frac{h}{\sqrt{l_i l_j}} \delta_{ij} \delta_{ss'} \delta_{tt'}$$

Si ha per $i = j$

$$\sum_R [\Gamma(R)_{s't'}^i]^* \hat{R}\phi_i^i = \left(\frac{h}{l_j}\right) \phi_s^i \delta_{ij} \delta_{tt'}$$

$$\longrightarrow \hat{P}_{s't'}^i = \frac{l_j}{h} \sum_R [\Gamma(R)_{s't'}^i]^* \hat{R}$$

$$\longrightarrow \hat{P}_{s't'}^i \phi_i^i = \phi_s^i \delta_{ij} \delta_{tt'}$$

Operatori di Proiezione di uso più comodo

$$\hat{P}^{i_{i'}} = \frac{l_j}{h} \sum_R [\Gamma(R)^{i_{i'}}]^* \hat{R}$$

$$\begin{aligned} \hat{P}^j &= \sum_{i'} \hat{P}^{i_{i'}} = \frac{l_j}{h} \sum_{i'} \sum_R [\Gamma(R)^{i_{i'}}]^* \hat{R} \\ &= \frac{l_j}{h} \sum_R \left\{ \sum_{i'} [\Gamma(R)^{i_{i'}}]^* \right\} \hat{R} \\ \hat{P}^j &= \frac{l_j}{h} \sum_R \chi(R)^j \hat{R} \end{aligned}$$

E' sufficiente conoscere la traccia delle rappresentazioni, ovvero i caratteri, per proiettare la funzione di base scelta in una delle rappresentazioni irriducibili del gruppo di simmetria